

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

BROMATOLOGIA ANIMAL      CAMPUS TAPACHULA

**Materia:**

BROMATOLOGIA ANIMAL

**Docente:**


Barreda sedano garcia

**Integrantes:**

Alexis Antonio Velásquez Villatoro

**Fecha:**

08 de mayo del 2021



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Facultad de Medicina Veterinaria y  
Zootecnia

BROMATOLOGIA ANIMAL

CAMPUS TAPACHULA

Materia:

BROMATOLOGIA ANIMAL

Docente:

Barreda sedano garcia

Integrantes:

ALEXIS ANTONIO VELASQUEZ VILLATORO

TAREA:

Cuadro comparativo

Cuadro comparativo		
	característica	diferencia
gramíneas	En matas como el maíz, es decir una planta sola, pequeños, medianos o grandes, en la parte inferior esta la vaina, que envuelve el tallo y en la superior el limbo o laminilla	Rastrera, o macollos, pasto bajo de 10 a 45 cm, los medianos crecen 0,60 a 1.20 metros, altos de unos 1.50 a 2.50 taños articulados raíces fibrosa
leguminosas	Forma de vaina, deben de contribuir de un 30 a 50 porciento de forraje, raíces profundas y nódulos nitrificantes, las hojas anchas, las semillas siempre crecen en una vaina, rica en calcio	Mejora la fertilidad de la tierra, erecto o rastrero de diferente forma, compiten por luz, nutrientes y espacio

