


Lic. Enfermería

Fisiopatología

Dr. Miguel Basilio Roblero


E.L.E. Andrea Guadalupe Ramírez Pérez





Mas frecuente en mujeres


- Factor de riesgo**
- Edad
  - Sexo
  - Genética
  - Obesidad
  - Actividades laborales repetitivas



Mas frecuente en mujeres


Las articulaciones que se inflaman con más frecuencia son las muñecas, los nudillos, las articulaciones de los dedos de las manos y de los pies, los codos, los hombros, las caderas, las rodillas y los tobillos

Es una artritis inflamatoria en la que las articulaciones donde se incluyen manos, pies, dando lugar a hinchazón, dolor y frecuentemente destrucción articular



Enfermedad articular degenerativa caracterizada por un deterioro progresivo del cartilago hialino acompañado de alteraciones sinoviales y del hueso subcondral

Se puede padecer entre 40 y 50 años de edad



**Artritis vs Artrosis**

*Ambas son enfermedades reumáticas que provocan dolor, pero ¿cómo se diferencian?*

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Afecta la membrana sinovial</b></p> <p>Asociado a enfermedades autoinmunes o infecciones</p> <p>El dolor suele ser constante</p> <p>Suelen asociarse síntomas extra-articulares (pérdida de peso, cansancio, etc)</p> <p>El diagnóstico suele requerir análisis de sangre y otras exploraciones</p> | <p><b>Afecta al cartilago</b></p> <p>Asociado al desgaste producido por la edad</p> <p>El dolor empeora con la movilidad y mejora con el reposo</p> <p>No suele haber síntomas extra-articulares</p> <p>El diagnóstico se suele realizar a través de los síntomas, la exploración física y radiología</p> |
|---|---|

