



UNIVERSIDAD DEL SUR

*** ARTROSIS ARTRITIS ***

- **PATOLOGÍA DEL ADULTO**

- **BASILIO DOBLERO MIGUEL**

- **SALOMÉ CARRASCO GONZÁLEZ**

GRADO: 6^a

GRUPO: "A"

**MIÉRCOLES 24 DE JUNIO 2021
TAPACHULA, CHIAPAS**

ARTRITIS REUMATOIDE

ENFERMEDAD AUTOINMUNITARIA

Caracterizada por ataque a los tejidos propios, como el cartílago y el revestimiento de las articulaciones, por el sistema autoinmunitario del cuerpo

Síntomas

- Inflamación de las articulaciones
- Calor, rubor, aumento de tamaño y dolor
- Destrucción de articulaciones
- Pérdida de función

Afecta principalmente articulaciones mas pequeñas y evidencia agresión activa contra el cartílago

- El dolor se caracteriza por dolor constante, empeora con el reposo
- Afección bilateral y simétrica de ambas manos
- Sufre rigidez matutina con duración variable, incluso por horas
- Existe deformidad que afecta al hueso, ligamentos y tendones

El crecimiento del tejido de granulación distorsiona los dedos

- La membrana se engrosa y se acumula liquido sinovial
- La membrana produce un tejido de granulación anormal,
- Se adhiere a la superficie del cartílago articular y erosiona por completo
- El tejido fibroso se osifica y fusiona la articulación

TRATAMIENTO

- Antiinflamatorios
- Corticoides
- Inmunosupresores
- Biología molecular



ARTROSIS

ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA

Caracterizada por la perdida gradual del cartílago causado por envejecimiento, obesidad, irritación de las articulaciones, debilidad muscular y desgaste por el uso

- Síntomas
- Limitación de los movimientos
- Crujidos

Afecta principalmente al cartílago articular
La membrana sinovial se inflama en ocasiones

- El dolor se caracteriza con el movimiento y mejora con el reposo
- Afección en una mano y en otra no
- Sufre rigidez matutina con duración menor de 15 - 30 minutos
- Existe deformidad debido a destrucción del hueso y alteración de las estructuras colindantes

Ataca principalmente las grandes articulaciones: Rodilla y cadera

- El cartílago se deteriora y forma hueso nuevo en el área subcondral y en los borde de la articulación
- El cartílago se degenera con lentitud cuando los extremos del hueso quedan expuestos, se depositan osteofitos
- Los osteofitos disminuyen el espacio de la cavidad articular y restringen el movimiento de la articulación

TRATAMIENTO

- Analgésico
- Rehabilitación
- Implantes de hialuronato