



Nombre de la universidad: UDS (Universidad Del Sureste).

Nombre de la carrera: Licenciatura en enfermería.

Materia: patología del adulto.

Nombre del Maestro: Miguel Basilio Robledo.

Nombre de la alumna: Loyda Eunice Hernández Pérez.

Grado y grupo: 6to Cuatrimestre Semiescolarido.

Lugar y fecha: Tapachula Chiapas 29 de julio del 2021.

Colecistitis

- Inflamación en la vesícula producida la obstrucción por cálculos biliares (puede ser aguda o crónica).
- Puede producir dolor en el cuadrante superior derecho, hombro, en el epigástrico, fiebre (38°C), falta de apetito, náuseas o vómito, coloración amarilla en la piel y esclerótica, heces e color arcilla.
- El diagnóstico se da a través de ecografía, TC.
- Suele tratarse mediante la extirpación del órgano.
- +Colecistectomía laparoscópica (de 1 a 2 semanas de recuperación).
- +Colecistectomía abierta (de 4 a 6 semanas de recuperación).

Coledocolitiasis


- Es la presencia de cálculos en el conducto biliar.
- Produce cólico agudo, dolor en el cuadrante superior derecho, fiebre, escalofríos, ictericia, infección e inflamación del conducto biliar, orina oscura.
- El diagnóstico se realiza a través de ecografía, TC, colangiografía por resonancia magnética, colangiopacreatografía retrograda endoscópica.
- Se trata mediante la extracción.

Hernia umbilical

- Es la formación de un bulto debido a que una parte del intestino o tejido graso sobresale cerca del ombligo.
- Se presenta más en bebés que en adultos.
- No suele producir dolor en niños ni molestia alguna, en adultos dependiendo el tamaño puede causar dolor o malestar. Cuando la hernia es muy grande puede generar mucho dolor, vómito y sensibilidad en la zona.
- La tos, obesidad, embarazos múltiples y la edad; son factores para generar una hernia umbilical.
- Se diagnostica a través de la exploración física.
- Puede tratarse a través de cirugía abierta o laparoscópica.

Hernia inguinal

- Se presenta en la parte superior de la ingle, surge cuando una parte del tejido del intestino sobresale por una zona del músculo que se encuentre debilitado.
- Puede producir dolor, presión en la ingle, hinchazón alrededor de los testículos, debido a que la parte sobresaliente del intestino desciende al escroto.
- Puede ser provocada por hacer esfuerzo al ir al baño, actividad extenuante, tos constante, en el embarazo puede ser acto presente.
- Pueden presentarse otros síntomas como náuseas/vómito, fiebre, dolor muy fuerte, coloración del bulto (rojo, violáceo) dificultad para evacuar.
- Se diagnostica a través de la exploración física, ecografía, TAC.
- Puede tratarse a través de cirugía.



Bibliografía

Libro de porth fisiopatología Grossman mattson

<https://drive.google.com/file/d/1olgU0rvpJfbtHC67zvqmV1bFjJWtkVy/view>

<https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/hernia-inguinal>