



NOMBRE DE ALUMNO: JOSE ANDRES PINTO

Nombre del profesor: NESTOR
ALFARO GUTIERREZ

Grado: 6

GRUPO: U

Nombre del trabajo: Mapa

Materia: cerdos

PASIÓN POR EDUCAR

Manejo de la alimentación

Alimentación de reproductores

Se define

es conveniente considerar en global la vida productiva de las cerdas reproductoras; por motivos didácticos, la alimentación de reproductoras requiere tener en cuenta, al menos, dos situaciones

Se divide

cerdas jóvenes, nulíparas hasta la primera cubrición fértil o cerdas de reposición.

cerdas en gestación y lactación o animales propiamente en reproducción

Alimentación de cerdas nulíparas o de reposición.

Se define

cerdas nulíparas se pueden adquirir recién destetadas (alrededor de un mes de vida), a la salida de la transición (entre dos y tres meses de vida) o, más comúnmente, como "animales de reposición" o incluso, alternativamente, se puede llevar a cabo la reposición en la propia granja.

animales/cerdas de reposición" a empresas especializadas que llegan a la granja con una edad aproximada de 160-170 días, un peso vivo de alrededor de 100-105 kg y un valor P2 aproximado de 10-12 mm

Alimentación de gestación y lactancia

Se define

como el estudio y análisis de los resultados reales de una empresa, enfocados desde distintas perspectivas y momentos, comparados con los objetivos, planes y programas empresariales

Se divide

cerdas demasiado delgadas

es aumento en el intervalo destete cubrición fértil y reducción de la tasa de partos, reducción del tamaño de la siguiente camada y peso de los lechones y aumento del ritmo de reposición

cerda demasiado engrasada

es dificultades al parto y aumento de los nacidos muertos, reducción de la ingestión en lactación, aumento de la mortalidad embrionaria posterior

alimento de gestación)

es Los primeros días después de la cubrición el segundo periodo se alarga hasta cuatro semanas antes del parto as últimas semanas de gestación coinciden con el máximo crecimiento de los fetos y por ello la cantidad

Alimentación en el destete/transición

Se define

El destete es uno de los puntos más críticos de la vida del cerdo. Se realiza de forma abrupta y el lechón se ve sometido

Se divide

pierden el instinto protector de la madre tras su separación física

on alojados en nuevas instalaciones donde han de convivir con sus hermanos, pero también con otras camadas y

sufren un estrés nutritivo al pasar de consumir leche a pienso sólido

Alimentación durante el crecimiento y engorda.

Se define

los lechones se destetan con una edad de entre menos de 21 días y 28 días, con un peso vivo medio de 5,0 a 7,0 kg, y se sacrifican entre los cinco y seis meses de vida con aproximadamente 100-105 kg de peso vivo

Se divide

periodo de destete-transición, entre el destete y los 18-25 kg de peso vivo (60-80 días de vida), en que los lechones adaptan su sistema digestivo a la alimentación sólida .

el periodo de crecimiento y engorde en que la alimentación no se puede catalogar de compleja desde el punto de vista técnico, pero alcanza la máxima importancia económica