

Nombre de alumno: Dania marthita flores Abelar

Nombre del profesor: MARIA DEL CARMEN
LOPEZ SILBA

Nombre del trabajo: mapa conceptual


Materia: PRACTICAS PROFESIONALES

Grado: octavo cuatrimestre Lic. Enfermería

Grupo: 9 ° "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 junio de 2021

Unidad II. Cómo actuar ante una emergencia



2.3.1 Aborto espontáneo

Un aborto es:

Es la pérdida espontánea de un feto antes de la semana 20 del embarazo la pérdida del embarazo después de 20 semanas se llama muerte fetal.

Un aborto espontáneo:

Es un suceso que ocurre naturalmente, a diferencia de los abortos médicos o abortos quirúrgicos. También se le puede llamar "aborto natural"

Otros términos para referirse a una pérdida temprana en el embarazo son:

- Aborto consumado: todos los productos (tejidos) de la concepción salen del cuerpo.
- Aborto incompleto: solo algunos de los productos de la concepción salen del cuerpo.
- Aborto inevitable: no se pueden detener los síntomas y se presenta el aborto espontáneo.
- Aborto infectado (séptico): el revestimiento del vientre (útero) y cualquier producto restante de la concepción resultan infectados.
- Aborto retenido: el embarazo se pierde y los productos de la concepción no salen del cuerpo

Causas:

- Problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé
- Drogadicción y alcoholismo
- Exposición a toxinas ambientales
- Problemas hormonales
- Infección
- Sobrepeso
- Problemas físicos de los órganos reproductores de la madre
- Problemas con la respuesta inmunitaria del cuerpo
- Enfermedades graves en todo el cuerpo (sistémicas) de la madre (como la diabetes no controlada)
- Tabaquismo

Los posibles síntomas incluyen:

- Lumbago o dolor abdominal sordo, agudo o de tipo cólico
- Material tisular o en forma de coágulos que sale de la vagina
- Sangrado vaginal con o sin cólicos abdominales

Las pruebas y exámenes que se hacen son:

- Examen pélvico, ultrasonido abdominal, exámenes de sangre.

Su tratamiento consiste en:

- El tejido que sale de la vagina debe ser examinado (puede ser útil para determinar si hay una causa tratable del aborto espontáneo)
- Averiguar si aún queda algún tejido fetal dentro del útero
- Si el tejido no sale de forma natural puede necesitar quedar bajo una vigilancia cuidadosa hasta 2 semanas
- Es posible que se necesite cirugía (dilatación y legrado, D y C) o medicamentos para eliminar los contenidos restantes de su útero.
- Cualquier sangrado vaginal posterior debe ser vigilado cuidadosamente

Se recomienda:

Esperar un ciclo menstrual normal antes de tratar de quedar embarazada de nuevo

Las posibles complicaciones pueden

- Síntomas de una infección incluyen fiebre, sangrado vaginal que no para, cólicos y un flujo vaginal fétido
- Después de un aborto espontáneo, las mujeres y sus parejas pueden sentirse tristes.

Apendicitis

Es:

La inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen

El apéndice:

Es un órgano pequeño en forma de tubo unido a la primera parte del intestino grueso no tiene una función conocida

Este tiene:

Tiene una longitud de 10 centímetros consta con una cavidad angosta en el centro que se halla recubierta por una mucosa, que es muy abundante en tejido linfóide

Causas

Cualquier obstrucción en el drenaje de la mucosidad hace que esta se acumule y por tanto se produzca una dilatación en el apéndice.

Por lo que:

A medida que se va ampliando el tamaño del apéndice se va produciendo la compresión de los vasos sanguíneos y la necrosis de sus paredes este proceso puede evolucionar hasta que se produce la rotura del apéndice

Esa obstrucción puede ser causada por:

- Aumento de los tejidos linfáticos por infección viral o bacteriana
- Obstrucción por otras circunstancias más complejas tumores o lombrices intestinales.

Sus signos y síntomas son:

- Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen
- Dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y a menudo se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen
- Dolor que empeora cuando toses, caminas o realizas otros movimientos bruscos
- Náuseas y vómitos
- Pérdida de apetito
- Fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza
- Estreñimiento o diarrea
- Hinchazón abdominal

puede causar complicaciones graves, por ejemplo:

- La perforación del apéndice puede causar que la infección se esparza por el abdomen (peritonitis).
- Una acumulación de pus que se forma en el abdomen sin el apéndice se revienta es posible que se cree una acumulación de infección (absceso).

Su tratamiento consiste en:

Cirugía para extraer el apéndice (apendicetomía) o laparoscópica

Los cuidados de enfermería

- Manejo del dolor, para mejorar el confort físico
- Cuidado de la herida quirúrgica, para evitar la aparición de infección
- Administración de medicamentos.
- Enseñar sobre el uso de la faja abdominal
- Promoción de la movilización temprana
- Control de la diuresis
- Detección de signos y síntomas de infección
- Control de ruidos intestinales
- Enseñar de cuidados por operatorios al darse de alta el paciente.

