



Nombre de alumnos: Marina García Morales

Nombre del profesor: Mahonrry de Jesús Ruiz

Materia: Práctica Clínica de Enfermería I

Grado: 6° cuatrimestre

Grupo: A

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez, Chiapas; junio de 2021.

Unidad 2

Esterilización con pavor

Concepto: La esterilización consiste en matar o inactivar de manera irreversible todos los microorganismos capaces de reproducirse.

Tipos

CALOR SECO: casi no se utiliza, ya que el material a esterilizar debe sufrir una temperatura de 180° C. durante 30 min., con lo que sale "quemado".

CALOR HÚMEDO (VAPOR DE AGUA): el agente esterilizante es el vapor de agua. La esterilización se producirá teniendo en cuenta tres parámetros, TEMPERATURA, PRESIÓN Y TIEMPO.

Autoclaves: Gravitatorios: ya casi no se utilizan.

Pre vacío: El más utilizado en el medio hospitalario es el autoclave de vacío fraccionado (los diferentes programas, alternan varios vacíos con inyecciones de vapor).

Preparación de soluciones intravenosas

Objetivo: garantizar la seguridad y eficacia de la terapéutica intravenosa administrada a los pacientes hospitalizados.

Condiciones: Cumplir con los requisitos farmacotécnicos adecuados al paciente. Ser terapéuticamente adecuadas a cada paciente en particular. Tener la identificación del paciente y del contenido con datos de conservación. Realizar, en conjunto con el equipo de salud, el seguimiento terapéutico de aquellos tratamientos que por sus características especiales de complejidad. Reducción de efectos adversos y de errores de medicación, entre otros.

Registro de observaciones de enfermería

Concepto: Es el documento donde debemos registrar las incidencias que se producen en la asistencia al paciente y el resultado del Plan de Cuidados durante su estancia en la Unidad.

Integración: A.- Identificación-localización. B.- Fecha/hora. C.- Observaciones/firma.

Unidad 3

Instalación de catéter venoso central.

Definición: Es un procedimiento clave en el abordaje del enfermo crítico, por lo que, en un intento de minimizar el tiempo de actuación sobre estos pacientes, se ha iniciado su progresiva implantación en el servicio de urgencias.

Sitios anatómicos

1. Yugular posterior.
2. Yugular anterior.
3. Subclavio.

Inspiración de secreciones traqueobronquiales con sistema cerrado.

Definición: Es la succión de secreciones a través de un catéter conectado a una toma de succión.

Objetivos:

1. Mantener la permeabilidad de las vías aéreas.
2. Favorecer la ventilación respiratoria.
3. Prevenir las infecciones y atelectacias ocasionadas por el acumulo de secreciones.

Indicaciones: La técnica está indicada cuando el paciente no puede por sí mismo expectorar las secreciones.

Vigilancia y control del proceso de cambio de bolsas de diálisis peritoneal.

Definición: Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesional de enfermería para realizar el cambio de la bolsa de diálisis peritoneal de manera eficaz y segura para el paciente con tratamiento sustitutivo de la función renal.

Objetivos: 1. Realizar el cambio de bolsa de diálisis peritoneal de forma segura y eficaz. 2. Promover la extracción de líquidos y productos de desecho provenientes del metabolismo celular que el riñón no puede eliminar

Indicaciones: · Pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica terminal en tratamiento sustitutivo con diálisis peritoneal. Paciente postoperado de cirugía cardiovascular con insuficiencia cardíaca derecha. Fuga de líquido peritoneal a través del sitio de emergencia del catéter. Evidencia de obstrucción física del catéter. Absceso abdominal..

Posiciones para proporcionar comodidad o cuidados al paciente.

Posición de decúbito: Decúbito es toda posición del cuerpo en estado de reposo sobre un plano horizontal. Según sea la parte de cuerpo en contacto con la superficie, se diferencian distintos decúbitos.

Decúbito supino o dorsal: La persona se encuentra tendida boca arriba, en posición horizontal, con la espalda en contacto con la superficie y las extremidades inferiores extendidas.

Decúbito prono, ventral o abdominal: La persona se encuentra tendida sobre el pecho y el abdomen, con la cabeza girada hacia un lado, las extremidades superiores extendidas junto al cuerpo o flexionadas a nivel del codo y los miembros inferiores extendidos.

Decúbito lateral: La persona se encuentra tendida de lado, con uno u otro costado sobre la superficie, el miembro superior del lado en que se halla recostado por delante del cuerpo, y los miembros inferiores extendidos, un poco flexionados o con el que queda arriba algo flexionado y adelantado.

Posición de Fowler: Se trata de una posición dorsal en un plano inclinado de tal modo que la espalda forme un ángulo de unos 45 grados con la horizontal. Se obtiene al elevar unos 40-50 cm la cabecera de la cama.

Posición genupectoral: La persona se coloca abajo, apoyándose sobre las rodillas y el pecho, con la cabeza ladeada y los muslos perpendiculares a la cama.

Posición ginecológica o de litotomía: Es una posición de decúbito supino con las piernas flexionadas sobre los muslos y los muslos en abducción y flexión sobre la pelvis.

Bibliografía consultada.

- **Practica Clínica de Enfermería I. Licenciatura en Enfermería. Sexto cuatrimestre. Mayo-agosto. UDS. Págs. 041-084.**