



**Nombre de alumnos: Azucena
Ramírez Hernández**

Nombre del profesor: Javier Gómez galera

Nombre del trabajo: mapa conceptual

Materia: práctica clínica de enfermería

Grado: "6"

Grupo: "A"

Es el lavado realizado por los integrantes del equipo quirúrgico antes de su ingreso al quirófano, siempre está indicado un jabón antiséptico

Recordar que el uso del cepillado no es necesaria para reducir la carga microbiana cuando se utiliza antiséptico con efectos residual.

La llave se accionara con pedal o con el codo o célula fotoeléctrica. • Mojar las manos con agua, aplicar el jabón antiséptico 3- 5ml, restregar enérgicamente

Frotar las manos, palma con palma, palma derecha con dorso de mano izquierda y palma izquierda con dorso de mano derecha, los espacios interdigitales de mano derecha y luego de mano izquierda

La abministracion de medicamentos son actividades de enfermería que realizan bajo presccion medica en las cuales la enfermera debe de enfocar lo reafirmal los conocimientos

Limpie uña por uña, de una mano y luego la otra. Se recomienda el cepillado quirúrgico, incluyendo los lechos ungueales y yema de dedos, durante 2 minutos.

Técnica lavado de mano aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano frotar las palmas entre si, frotar la palam de la mano derecha contra el dorso de la no izquierda enre lazado de los dedos viceversa

El manejo de abministracion de hemoderivado es una actividad que realiza el persona de enfermería por lo cual es gran importancia tener presente que un uso inadecuado de estos

La infuncion de hemoderivado es una técnica básicamente de enfermería que requiere un conocimiento profundo de las base fisiológicas

Para mantener limpias las vías aéreas, la aspiración de secreciones es un procedimiento efectivo cuando el paciente no puede expectorar las secreciones, ya sea a nivel nasotraqueal y orotraqueal

Material y equipo Aparato de aspiración (sistema para aspiración de secreciones de pared). Guantes desechables

Introducir la sonda suavemente en una de las fosas nasales, durante la inspiración del paciente. Cuando se tiene resistencia al paso de la sonda por nasofaringe posterior, se rota suavemente hacia abajo, si aún