

Se necesita por lo menos la presencia de por lo menos 2 episodios de depresión mayores al menos un episodio hipomaniaco completo

Trastorno bipolar Tipo 2

Diagnóstico

Es necesario que se cumplan los criterios para un episodio hipomaniaco actual o pasado y criterios para un episodio de depresión mayor

tratamiento

- Estabilizadores del animo: litio, valproato, carbamazepina, lamotrigina
- Anti-psicóticos de segunda generación: aripiprazol, lurasidona, o bupropiona, riperidona, ziprasidona

Diagnóstico

Es necesario que se cumplan los criterios para un episodio maniaco, antes o despues del episodio maniaco pueden haber existido episodios hipomaniacos o episodios de depresión mayor

Trastornos afectivos

Trastorno Bipolar Tipo 1

Se necesita por lo menos la presencia de un episodio maniaco completo y habituales episodios de presiuos

tratamiento

- Estabilizadores del estado de animo → litio
- Anti-psicótico de segunda generación

Pueden existir 3 fases:

- Aguda: estabilizar y controlar las manifestaciones iniciales
- Continuada: para alcanzar una remision completa
- Cronica o de prevención: para mantener a los pacientes en remision

Trastornos afectivos

Tratamiento

- Estabilizadores de l estado de animo
- Antidepresivos con o sin Benzodiazepinas (ansioliticos)
- Tecnicas de psicoterapia que prevengan futuros episodios

Criterios

Durante 2 años como minimo han existido periodos con sintomas hipomaniacos y depresivos sin que se cumplan los criterios de esos padecimientos. los episodios depresivos e hipomaniacos han estado presentes al menos la mitad del tiempo durante mas de dos meses seguidos

Es el diagnostico psiquiatrico que describe un trastorno del estado de animo considerando una forma leve de trastorno bipolar

Se caracteriza por la presencia de multiples episodios de hipomania con o sin irritabilidad, junto con episodios alternantes de depresion leve o moderada