



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina



Materia: Psiquiatría

Dra. Lía Gabriela Luna Villanueva


Mapas: Trastornos afectivos


Alumna:


Guadalupe Elizabeth González González

Semestre y grupo: 5 B

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 02 de noviembre 2021.







Trastorno Bipolar

Es un trastorno afectivo caracterizado por la presencia de episodios recurrentes en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del enfermo están profundamente alterados.

Definición

Factores de riesgo

Existe evidencia de que el riesgo de padecer trastorno bipolar, se incrementa cuando se tiene uno de los padres o un hermano con trastorno bipolar.

Diagnóstico

El diagnóstico temprano y preciso es importante para definir el tratamiento lo más pronto posible después del primer episodio.

El diagnóstico del TB se establece al realizar la evaluación clínica del paciente acorde con los criterios del DSM-V o ICD-10

El clínico debe estar alerta de la inestabilidad del cuadro clínico durante la revisión de los pacientes con TB.

Principales signos y síntomas de Manía e Hipomanía son:

- ⊕ Aumento de energía, hiperactividad, inquietud.
- ⊕ Autoestima exaltada o sentimientos de grandiosidad.
- ⊕ Irritabilidad extrema.
- ⊕ Pensamientos en cascada, lenguaje rápido, verboso, fugas de ideas o experiencias subjetivas de que el pensamiento está acelerado.

- De tal forma que la alteración en ocasiones consiste en una exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad (manía e hipomanía) y en otras en una disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y de la actividad (depresión), con presentaciones variables en la intensidad y duración de los episodios.

⊕ Optimismo excesivo

⊕ Distractibilidad, no puede concentrarse.
⊕ Disminución de la necesidad de dormir.

⊕ Juicio pobre

⊕ Creencias de una habilidad y poder no realistas, gastos y compras innecesarias

⊕ Hiperactividad sexual

⊕ Abuso de consumo de drogas, alcohol y medicamentos para dormir.

⊕ Aumento de la actividad intencionada ya sea en el trabajo, en los estudios o socialmente.

Tratamiento agudo Para la manía

- ② En el episodio agudo de la manía debe ser tratado con administración oral de un fármaco antipsicótico o Valproato.
- ② El litio debe ser usado para el control inmediato de la sobre-actividad o conductas peligrosas, o puede ser usado en combinación con un antipsicótico.
- ② El uso de antipsicóticos y/o benzodiazepinas vía intramuscular deben ser valorados en caso de urgencia o en aquellos casos en los que el paciente no acepta la vía oral.
- ② Las benzodiazepinas pueden ser utilizadas cuando la sedación del paciente es prioritaria.
- ② Los pacientes que cursan un episodio agudo de manía durante la fase de mantenimiento se deberá ajustar la dosis del esteroide actual y en su caso agregar un antipsicótico o Valproato.

Trastorno Bipolar

Principales signos y síntomas de depresión.

- ② Abatimiento del ánimo.
- ② Humor depresivo.
- ② Sentimientos de desesperanza o pesimismo.
- ② Sentimiento de culpa, de inutilidad o de abandono.
- ② Pérdida de interés en actividades cotidianas.
- ② Disminución en la capacidad de experimentar placer.
- ② Disminución de energía.
- ② Hipoactividad y lentitud psicomotora.
- ② Dificultad para concentrarse, disminución en la memoria y capacidad para tomar decisiones.
- ② Irritabilidad o inquietud.
- ② Insomnio o hipersomnio.
- ② Dolores crónicos o quejas somáticas.
- ② Ideas de muerte o de suicidio.

