

# Heridas por proyectil de arma de fuego

Fátima Andrea López Álvarez "5to B"

Medicina Forense

Masculino de aproximadamente  $25 \pm 5$  años el cual presenta herida de una herida por arma de fuego en la región temporal derecha, con presencia de hemorragia activa.

Presenta un orificio de entrada de aproximadamente 4 cm, bordes regulares, halo de fisch presente, tatuaje de pólvora.

Pronostico malo para la vida y para función

Con lo anterior se clasifica como una herida de distancia intermedia.



# TIPOS DE HERIDAS POR ARMAS DE FUEGO

	<b>larga distancia</b>	<b>Distancia intermedia</b>	<b>Quemarropa</b>	<b>Boca jarro</b>
Distancia	Mayor de 70cm	De 13 a 70 cm	5 cm	De 1 a 12 cm
Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herida circular</li> <li>• Presenta cintilla contusa</li> <li>• No tatuaje por la distancia</li> <li>• Solo el proyectil alcanza a la victima</li> <li>• Signos de contusión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halo de fisch</li> <li>• Tatuaje de pólvora</li> <li>• Similitud a la herida por quemarropa</li> <li>• A medida que se aleja, los puntos del tatuaje se van dispersando</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatuaje mixto por superposición del tatuaje por quemadura</li> <li>• Ahumamiento</li> <li>• Material biológico en el cañón, manos y ropa en el victimario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signo de calcado o de Bonnet</li> <li>• La presión contra la piel provoca la impresión de la misma</li> <li>• La piel envuelve la boca de fuego</li> <li>• Bordes quemados</li> </ul>