

# Universidad del Sureste



**Licenciatura en Medicina Humana**

**Docente:**

**Dr.- GERARDO CANCINO GORDILLO**

**Alumno:**

**Russell Manuel Alejandro Villarreal**

**Semestre y grupo:**

**5 "B"**

**Materia:**

**MEDICINA FORENSE**

**Proyecto:**

**Heridas por arma de fuego**

**Comitán de Domínguez, Chiapas a; 17 de noviembre  
de 2021**

# HERIDAS POR ▶ PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO

# DISPARO A QUEMA ROPA

- **Paciente:** masculino de 35 años de edad, +/- 5 años.
- **Región:** en la región temporal de la cabeza del lado derecho a lado de la zona orbicular del ojo derecho.
- **Tipo:** a quema ropa
- **Longitud:** 4cm
- **Diámetro:** 2cm
- **Profundidad:** 6cm
- **Bordes:** bordes regulares y perpendiculares con datos de excoriación y marcas de tatuaje “quemadura y incrustación de granos de pólvora”
- **Hemorragia:** sin datos de hemorragia
- **Pronóstico:** malo para la vida y la función



## Descripción

- Se presenta un paciente masculino de aproximadamente 35 años de edad, quien ingresa al mortuorio en el hospital maría ignacia gandulfo, por una herida de bala de tipo quema ropa en la región temporal de la cabeza del lado derecho a lado de la zona orbicular del ojo derecho. El paciente se encuentra inconsciente con datos de muerte clínicos y sin datos de hemorragia activa; con bordes de la herida regulares y perpendiculares con datos de excoriación y marcas de tatuaje “quemadura y incrustación de granos de pólvora”. La herida presenta una longitud de 4cm con una profundidad de 6cm y un diámetro de 2cm, el pronóstico es malo para la vida y la función.



# DISPARO A BOCA JARRO

- **Paciente:** femenina de 27 años de edad, +/- 5 años.
- **Región:** en el ojo izquierdo
- **Tipo:** a bocajarro
- **Longitud:** 7cm
- **Diámetro:** 3cm
- **Profundidad:** 5cm
- **Bordes:** orificio de entrada en forma estrellada “signo de Hofmann”, con bordes desgarrados, irregulares, y ennegrecidos por la pólvora incrustada. Con arrancamiento cutáneo.
- **Hemorragia:** sin datos de hemorragia
- **Pronostico:** malo para la vida y la función



## Descripción

- Se presenta un paciente masculino de aproximadamente 27 años de edad, quien ingresa al mortuorio en el hospital maría ignacia gandulfo, por una herida de bala de tipo bocajarro en la región del ojo izquierdo. El paciente se encuentra inconsciente, con datos de muerte clínicos y sin datos de hemorragia activa; con bordes de la herida que presenta orificio de entrada en forma estrellada "signo de Hofmann", con bordes desgarrados, irregulares, y ennegrecidos por la pólvora incrustada. Con arrancamiento cutáneo. La herida presenta una longitud de 7cm con una profundidad de 5cm y un diámetro de 3cm, el pronóstico es malo para la vida y la función.



# DISPARO A MEDIANA DISTANCIA

- **Paciente:** masculino de 20 años de edad, +/- 5 años
- **Región:** en la región temporal izquierda
- **Tipo:** disparo a media distancia
- **Diámetro:** 2cm
- **Profundidad:** 4cm
- **Bordes:** bordes regulares y perpendiculares, presenta características del anillo de Fisch con predominio de un repiqueteado hemorrágico disperso producido por los granos de pólvora quemado que se incrustan en la piel por la energía cinética. El tatuaje es indeleble.
- **Hemorragia:** sin datos de hemorragia activa
- **Pronóstico:** malo para la vida y la función



## Descripción

- Se presenta un paciente masculino de aproximadamente 20 años de edad, quien ingresa al mortuorio en el hospital maría ignacia gandulfo, por un disparo a media distancia en la región temporal izquierda . El paciente se encuentra inconsciente con datos de muerte clínicos y sin datos de hemorragia activa; con bordes de la herida regulares y perpendiculares, presenta características del anillo de Fisch con predominio de un repiqueteado hemorrágico disperso producido por los granos de pólvora quemado que se incrustan en la piel por la energía cinética. El tatuaje es indeleble.
- La herida presenta una profundidad de 4cm y un diámetro de 2cm, el pronóstico es malo para la vida y la función.



# DISPARO A LARGA DISTANCIA

- **Paciente:** masculino de 40 años de edad, +/- 5 años
- **Región:** en la región del tórax entre el cuarto y quinto espacio intercostal.
- **Tipo:** disparo de larga distancia
- **Diámetro:** 2cm
- **Profundidad:** 6cm
- **Bordes:** bordes regulares y aparentemente oblicuo, sin datos de equimosis y excoriaciones, hay ausencia absoluta de tatuaje verdadero.
- **Hemorragia:** con datos de hemorragia leve
- **Pronóstico:** malo para la vida y la función



## Descripción

- Se presenta un paciente masculino de aproximadamente 40 años de edad, quien ingresa al mortuorio en el hospital maría ignacia gandulfo, por una herida de bala de larga distancia en la región del tórax entre el cuarto y quinto espacio intercostal. El paciente se encuentra inconsciente con datos de muerte clínicos y con datos de hemorragia activa muy mínima; con bordes de la herida regulares y aparentemente oblicuo, sin datos de equimosis y excoriaciones, hay ausencia absoluta de tatuaje verdadero. La herida presenta una profundidad de 6cm y un diámetro de 2cm, el pronóstico es malo para la vida y la función.

# LESIONES POR PERDIGONES

- **Paciente:** masculino 30 años de edad, +/- 5 años de edad
- **Región:** dorsal ancho
- **Tipo:** lesión por perdigones
- **Longitud:** 10cm
- **Diámetro:** 7cm
- **Profundidad:** 8cm
- **Bordes:** bordes irregulares y desgarrados con datos de arrancamiento cutáneo, podemos ver otros datos como de equimosis, excoriaciones y laceraciones. Ausencia total de tatuaje verdadero.
- **Hemorragia:** sin datos de hemorragia activa
- **Pronostico:** malo para la vida y la función





## Descripción

- Se presenta un paciente masculino de aproximadamente 30 años de edad, quien ingresa al mortuorio en el hospital maría ignacia gandulfo, por unas múltiples herida de balas en forma de perdigones en la región del dorsal ancho . El paciente se encuentra inconsciente con datos de muerte clínicos y con datos de hemorragia activa muy mínima; con bordes de la herida irregulares y desgarrados con datos de arrancamiento cutáneo, podemos ver otros datos como de equimosis, excoriaciones y laceraciones. Ausencia total de tatuaje verdadero.
- La herida presenta una profundidad de 8cm y un diámetro de 7cm, el pronóstico es malo para la vida y la función.