

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Neurología.

Trabajo:
Distonía.

Docente:
Dr. José Luis Gordillo Guillen.

Alumno:
Mario Alberto Gordillo Martínez.

Semestre y Grupo:
6° "A"

**Comitán de Domínguez, Chiapas 03 de septiembre del
2021.**

Distonia.

La distonia es un trastorno del movimiento característico por una contracción muscular sostenida o intermitente que causa movimientos o posturas anormales, repetitivas o ambas, los movimientos distónicos son iniciados o empeorados por la acción voluntaria y se asocian con la activación de los músculos de otras partes del cuerpo.

Epidemiología.

La prevalencia de las distonias en conjunto parece ser mayor que la de muchas otras patologías mejor conocidas, pero por viabilidad en la metodología usada en los diferentes series no se conoce con exactitud la incidencia y prevalencia; En estados Unidos Americanos se menciona una prevalencia de 3:4 casos por cada 100,000 habitantes para la distonia a focal (2, 3) y en Europa la prevalencia para distonia primaria es de 130,000 caso en 10 millones de habitantes, entre estas la distonia focal esta entre 100 caso por millon.

Fenomenología

La distonia cumple 4 características en común.

1. Relativa y de larga duración al compararlos con la mioclonias y la corea, aunque pueda verse movimiento distónico de corta duración.

2- Contracciones simultaneas de musculos agonistas y antagonistas.

3- Regular en una torsión del segmento parafectoado.

4 Contracciones confincas de los mismos grupos musculares.

Tratamiento.

Tratamiento farmacológico: Anticolinérgicos, Dopaminérgicos, GABAérgicos, relajantes musculares.

Enfoque diagnóstico:

- características del movimiento.
- ¿Las Posturas son sostenidas?
- Características de apoyo
- cambio con la acción de otra parte del cuerpo (mejora o empeora).