

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Neurología

Resumen:

Trastorno de déficit de atención (VIDEO)

Docente:

José Luis Gordillo Guillén

Alumno:

Victor Eduardo Concha Recinos

Semestre y Grupo:

6° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 25 de Agosto de
2021.

"Trastorno por déficit de atención videos"

Victor Eduardo Concha Recinos

Epidemiología:

Datos recabados que afirmaban que en 2020 las patologías psiquiátricas son muy comunes, mencionan que hoy día por lo menos un 20% de los niños manifiesta un trastorno y además que solo el 10 de eso se trataba y el otro 10% no y es más común en varones

Etiología:

La dra nos dice que en todos los países se puede encontrar este trastorno pero donde es más común es en países con bajo estado socioeconómico; un ejemplo África pero no se descarta la idea de múltiples factores como:

- Neurobiología: ciertos partes del cerebro no se desarrollan bien, la influencia de genes; DAT; DART; DRDS; DAT; ETC.
- Neuroquímica: Influencia de neurotransmisores (en cantidades o proporciones indebidas) Dopamina y Noradrenalina.
- Ambientales: El uso de tabaco, estupefacientes durante el embarazo, prematurez del RN, al nacimiento, lesiones cerebrales e hipoxia, adversidad socioeconómica y bajo peso al nacer

Cuadro Clínico:

Los "síntomas medulares" son:

- Falta de atención
- Hiperactividad
- Impulsividad

Diagnostico:

- Por el momento no hay marcadores biológicos, con excepción del encefalograma y de los mapeos.
- Los criterios diagnósticos del DSM V son más certeros porque este trastorno es mucho más clínico: Impulsividad, Inatención e hiperactividad.

- Alguno de estas síntomas se presenta antes de los 12 años.
- Están presentes en 2 o incluso más ambientes.
- Existe evidencia de disfunción cognoscitiva/social.
- Los síntomas se sabe que no son secundarios a Psicosis o trastorno de ansiedad generalizada.

Clasificación:

- Inatención: Más frecuente en mujeres que hombres.
- Impulsividad: Dificultades importantes en el control conductual (es difícil diagnosticar pues cambia con las edades).
- Muñta: Interactúan todos los síntomas.

Tratamiento:

Se menciona como primera instancia que debe ser integral, y en lo farmacológico como estimulantes de la atención entran los Inhibidores selectivos de Dopamina y el Metilfenidato.