

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Neurología

Resumen:

Enfermedad de Parkinson

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Alumno:

Erick José Villatoro Verdugo

Semestre y Grupo:

6° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 03 de Septiembre
de 2021.

Enfermedad de Parkinson

De los síndromes parkinsonianos, podemos mencionar a la enfermedad de Parkinson, de las cuales, esta es la más frecuente y bien denominada como "de origen idiopático".

De las enfermedades neurológicas, esta es la 2^{da} más frecuente, (cabe mencionar que la 1^{ra} es la demencia). Hablando un poco de su **incidencia**, es frecuente tanto al li. de la población mayor de 65 años de edad.

Nota: Algo que me pareció muy importante mencionar es que es una enfermedad progresiva, es decir; con el paso del tiempo esta va empeorando poco a poco.

En cuanto hablamos de su fisiopatología podemos mencionar que se presenta una **disrupción** de la neurotransmisión de los ganglios basales y existe un problema, sobre todo de la sustancia negra, la cual es la **porción compacta**, la cual podemos encontrar a nivel de **mesencéfalo** a través de fibras que actúan en los receptores dopaminérgicos, los cuales están encargados de integrar el circuito cortical, donde se encuentra **miscluido tálamo, globo pálido y porción lateral**, la pérdida de neuronas de la dopamina se quedan a contaminar **Cuerpos de Lewy**

Como anteriormente dije, la visualización del comportamiento de estas personas es muy importante, pero ¿Qué debemos de visualizar del comportamiento de estas personas?

• El manual diagnóstico y estadístico DSM V nos marca pautas claras

- Cuadro específico junto al trastorno de tics motores o vocales crónicos (Duración > de 1 año y considerados como puros).

- Trastorno de tics transitorios (tanto motores como vocales cuya duración > a 4 semanas y < de 1 año)

- Trastorno de tics no especificado (de corta duración con una edad de aparición > de 18 años y presencia de un TIC motor y 1 verbal).

Pero bueno, la alteración generada por todo esto provoca malestar y conflicto social, interfiriendo tanto en las habilidades académicas como laborales del individuo. Los síntomas del Síndrome pueden variar de leves a severos pero en su mayoría suelen ser moderados y ante ello, es crucial no confundirlos con movimientos coreiformes, distónicos, atetóicos, mioclónicos y es que los acompañan en su mayoría de veces otros trastornos (incluida la erquizofrenia y comorbilidades).