

Universidad del Sureste
Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Neurología.

Trabajo:

Gilles de la Tourette.

Docente:

Dr. José Luis Gordillo.

Alumna:

Iriana Yaylín Camposeco Pinto.

Clave:

1

Semestre:

6to A

Comitan de Dominguez Chiapas 28 de Agosto del 2021

Gilles de la Tourette

El Síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados (tics) que no se pueden controlar con facilidad, por ejemplo que la persona afectada puede de manera repetida parpadear, encoger los hombros o emitir sonidos o palabras ofensivas. Los jóvenes con Síndrome de Tourette tenían trastornos mentales concurrentes, usaron más servicios de salud mental y medicamentos psicotrópicos que los jóvenes con otros trastornos de tics (trastorno crónico de tics motores o vocales). Los niños con asma y

trastornos mentales concurrentes a menudo requieren de medicamentos más complejos, así como una educación más para prevenir el empeoramiento de los síntomas. 1. Los niños con síndrome de Tourette tendrían mayores necesidades de atención médica. 2. Los niños con Síndrome de Tourette y uno o más trastornos mentales concurrentes tendrían mayores necesidades de atención médica y más problemas con la coordinación de la atención en la comparación con los niños con síndrome de Tourette sin un trastorno mental concurrente. 4. El síndrome de Tourette más grave se asociaría con más necesidades de atención médica. La presencia de un trastorno

externalizante se definió por el informe de los padres de trastorno por déficit de atención con hiperactividad u otro problema de comportamiento o conducta, mientras que la presencia de una condición de internalización incluyó depresión o problemas de ansiedad.

Los niños con síndrome de Tourette pura (pero no diagnóstico actual) y aquellos con síndrome de Tourette.

Los niños con síndrome de Tourette solo y el síndrome de Tourette con un trastorno mental tenían significativamente más necesidades de atención médica que los niños en el grupo de síndrome de Tourette pura.

Los niños con síndrome de Tourette tienen necesidades de atención médica similares o mayores que los de los niños con asma, y mayores que los de los niños de la población general. Aunque algunos niños pueden superar los síntomas de tics y ya no cumplen con los criterios para el síndrome de Tourette en la edad adulta temprana, estos niños aún pueden encontrar necesidades sustanciales de atención médica relacionadas con trastornos mentales, emocionales y de comportamiento concurrentes.