

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Neurología

Resumen:

Autismo

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Alumno:

Erick José Villatoro Verdugo

Semestre y Grupo:

6° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 22 de Agosto de
2021.

"Trastorno del Espectro Autista"

El trastorno del espectro autista, es específico del neurodesarrollo en donde se puede encontrar de una forma temprana (1 año) se mantienen 3 dimensiones las cuales se encuentran alteradas en esta patología: **Reciprocidad social, lenguaje y intereses restringidos repetitivos**. Los factores de riesgo que caben mencionar es la edad de los padres, siendo esta de riesgo en: **Padres mayores de 38 años y madres mayores de 35 años**, aumentando las posibilidades hasta 5 veces más o otro factor de riesgo que de igual manera se puede resaltar es la **inexposición ambiental**. Otros un poco menos relevantes pero que de igual manera entran son: **Tratamiento hormonal para infertilidad, Fallas sociales en los padres y ↑ de copias anormales** y cabe mencionar el trabajo de los padres o las carencias de herramientas en la madre, (sin descartar el consumo de estupefacientes, tabaco, etc.) y puede ser increíble hasta un 90%. De las manifestaciones clínicas o **CARACTERÍSTICAS** que presentan estos pacientes se encuentra en primer lugar: **Fijación visual persistente en objetos inusuales** - **Movimientos repetitivos anormales** (por lo regular no deberían de estar presentes a los 2 años) - **La ausencia de balbuceo a los 24 meses** (No cuenta; papá o mamá). **Comportamiento o ausencia de intención comunicativa**

"Habitación de la mente"

Una característica más a usualizar es: Disminución del Interés durante la Interacción con personas. Otros signos que pueden considerarse como de **IALAKMAI** puede ser que los pacientes tengan un curso o desarrollo normal y con el tiempo este cese: pérdida de habilidades como el ambiente social, la pérdida del contacto usual, la pérdida de los gestos; como decir "hola & Adios"; las habilidades motoras finas. **por lo regular de 16 a 24 meses**. Según el DSM V, existen 3 entenos clasificados; como deficiencias: reciprocidad socio-emocional, conductas comunicativas no verbales y desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Como patrones restrictivos: Movimientos estereotipados o repetitivos, inflexibilidad de rutinas Intereses muy restringidos y tipos e hiper o hipocatividad De la fisiopatología podemos destacar que es un trastorno de la Organización neuro cortical que produce un defecto en el procesamiento de la Información del sistema nervioso central, y de igual manera podemos encontrar alteraciones en la organización sináptica y dendrítica hasta la conectividad de las estructuras cerebrales. y para finalizar, el tratamiento, debe ser multifactorial y independiente. Amoxicilina (hiperactividad, inatención) Clonidina Guanfacina (inatención) Anprizolol (irritabilidad e Inatención). Bupropiona (Lenguaje Inapropiado)