

Universidad del Sureste
Escuela de Medicina Humana

SEMESTRE:

6° A

MATERIA:

NEUROLOGÍA.

CLAVE:

1.

DOCENTE:

DR. JOSÉ LUIS GORDILLO.

ALUMNO (A):

IRIANA YAYLÍN CAMPOSECO PINTO.

COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, 13 DE OCTUBRE

Valoración de Radiculopatía.

Pérdida o disminución de la función sensitiva o motora de una raíz nerviosa, misma que se encuentra distribuida en un dermatoma específico. La radiculopatía o la lesión de una raíz nerviosa es una causa común de dolor o debilidad en el cuello, brazos, espalda baja y extremidades inferiores. El dolor radicular que se produce a este nivel involucra región cervical, los miembros superiores e inferiores, este último en el peor de los casos, y región torácica. Se manifiesta con alteraciones

motoras, sensitivas o en los arcos reflejos, esto en un territorio o distribución de la raíz nerviosa afectada. Se presenta con mayor frecuencia entre los 50 y 55 años de edad y es más común en hombres, con una incidencia de 107,3 por cien mil y 63,5 por cien mil para las mujeres.

Radiculopatía Lumbo-Sacra.
La compresión nerviosa es el mecanismo que con mayor frecuencia se asocia con daño neuronal en las extremidades inferiores. Puede presentarse en zonas periféricas como en el Tíndrone del

túnel del tarso o con
mayor frecuencia en zonas
centrales como ocurre en
las protrusiones discales.
Las radiculopatías de los
cuatro primeros segmentos
cervicales son raras. Debido
a la imbricación de las
dermatomas correspondientes
a estas raíces, los
trastornos sensitivos a que
da lugar la afectación de
una sola raíz son mínimos
y difíciles de precisar.
También son difícil apreciación
los trastornos motores, es
necesaria la afectación de
varias raíces para que
un déficit muscular pueda
apreciarse clínicamente.

túnel del tarso o con
mayor frecuencia en zonas
centrales como ocurre en
las protrusiones discales.
Las radiculopatías de los
cuatro primeros segmentos
cervicales son raras. Debido
a la imbricación de las
dermatomas correspondientes
a estas raíces, los
trastornos sensitivos a que
da lugar la afectación de
una sola raíz son mínimos
y difíciles de precisar.

También son difícil apreciación
los trastornos motores, es
necesaria la afectación de
varias raíces para que
un déficit muscular pueda
apreciarse clínicamente.