

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Neurología

Resumen:

Guilles de la Tourette

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Alumno:

Erick José Villatoro Verdugo

Semestre y Grupo:

6° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 28 de Agosto de
2021.

Tengo el Síndrome de Tourette

El Síndrome de Tourette, es un tipo de defecto Cerebral, Neurológico con el que se nace y el cual llega a producir Tics.

Cabe mencionar que a diferencia de patologías propias de Intelectología, el Síndrome de Tourette no es Contagiosa, que estas personas no son diferentes al resto. Ya que estas condiciones se podrá decir que son Incontrolables o más bien, Involuntarias, a diferencia de mil cosas que las personas con este síndrome pueden controlar, los Tics NO entran ahí, pero podemos mencionar a parte del malestar psicológico y físico que les causa ello, como las críticas, los malos comentarios, el bullying y el menosprecio de algunas personas por con estas personas. Pero, algo muy importante para mencionar es ¿Realmente se pueden controlar los Tics? pues no, estas personas cuando tratan de hacerlo se sienten demasiado Incómodos o incluso llegan a presentarlos en gran proporción y con una mayor frecuencia.

No es, sino hasta hace algunos años que la experiencia que se tenía sobre estos casos era muy escasa pero que en la actualidad si tenido gran auge que se ha logrado poder incluir a estas personas en actividades sociales. Debemos de aprender a prestar atención a los niños para poder llegar antes a su dx.

Como anteriormente dije, la visualización del comportamiento de estas personas es muy importante, pero ¿Qué debemos de visualizar del comportamiento de estas personas?

• El manual diagnóstico y estadístico DSM-IV nos marca pautas claras

- Cuadro específico junto al trastorno de tics motores o vocales crónicos (Duración > de 1 año y considerados como puros).

- Trastorno de tics transitivos (tanto motores como vocales cuya duración > a 4 semanas y < de 1 año)

- Trastorno de tics no especificado (de corta duración con una edad de aparición > de 18 años y presencia de un TIC motor y 1 verbal).

Pero bueno, la alteración generada por todo esto provoca malestar y conflicto social, interfiriendo tanto en las habilidades académicas como laborales del individuo. Los síntomas del Síndrome pueden variar de leves a severos pero en su mayoría suelen ser moderados y ante ello, es crucial no confundirlos con movimientos coreográficos, distónicos, atetóicos, mioclónicos y es que los acompañan en su mayoría de veces otros trastornos (incluida la esquizofrenia y comorbilidades).