

Universidad del Sureste
Escuela de Medicina Humana

SEMESTRE:

6° A

MATERIA:

NEUROLOGÍA.

CLAVE:

1.

DOCENTE:

DR. JOSÉ LUIS GORDILLO.

ALUMNO (A):

IRIANA YAYLÍN CAMPOSECO PINTO.

Huntington

Es un trastorno neurodegenerativo progresivo autosómico dominante. Se caracteriza por:

- Un trastorno del movimiento
- Deterioro cognitivo y cambios de comportamiento que conducen a un aumento implacable de la discapacidad y, en última instancia, a la muerte.

Características Clínicas:

- Trastorno del movimiento
- Cambios de comportamiento
- Anomalías del movimiento ocular
- Tics, Ataxia
- Distancia CGH juvenil

Manifestaciones: La depresión es común y responsable de un aumento de las tasas de suicidio en la Enf. H.

El espectro de anomalías conductuales incluye:

- Ansiedad - Ataques de Pánico.
- Síntomas obsesivos, compulsivos, rasgos maníacos.
- Psicosis (miedo, angustia).
- Irritabilidad y comportamiento agresivo.

Diagnóstico:

Criterios clínicos: Antecedentes

familiar de enfermedad

similar, presencia de

movimientos involuntarios

tipo coreico, trastorno del

carácter comportamental y

deterioro cognitivo.

Criterios por imágenes:

La tomografía axial computada

cerebral y la resonancia

magnética nuclear, Permiten

apreciar la atrofia a nivel del estriado (Núcleo Caudado y Putamen) y de la corteza cerebral.

Administración

Quetiapina y la clozapina a menudo utilizados para tratar la psicosis en pacientes con trastornos del movimiento.

Levodopa: Puede ser necesaria en pacientes con enfermedad de Huntington con enfermedad avanzada y rigidez severa.

Neurdepticos atípicos: también pueden ser útiles en el manejo de la irritabilidad emocional.

(SRSS), la depresión.