

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Neurología

Resumen:

Hemorragia intracraneal

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Alumno:

Víctor Eduardo Concha Recinos

Semestre y Grupo:

6° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 13 de
Octubre de 2021.

Hemorragia Intracraneal del R.N.

Antecedentes:

Un estudio realizado en neonatos utilizando el método transversal reveló la descripción clínica de síntomas y signos que se presentaban en prematuros con bajo peso y se dice que la mayoría de estos niños llegaban a pesar menos de 2000 gr.

Metodos:

Como ya mencioné, este estudio realizado fue de tipo transversal, el cual se realizó con historias clínicas que se encontraban en el hospital general "Dr. Bernardo J. Gastelum" del estado de Sinaloa este llevo un tiempo estimado que comprendió de Marzo del 2003 a Enero de 2005.

Algo importante es que los niños a los que se le realizó el estudio tenían que tener menos de las 37 semanas de gestación.

Se obtuvieron resultados siguientes:

- 7859 niños incluidos al estudio
- 56% Varones
- 63% con sepsis severa
- 22% Pretermino
- 263% Menos de 37 semanas de gestación

Todo esto nos orienta para estratificar el riesgo de hemorragia intracraneal

Coadro Clínico

Se menciona que durante el estudio, las características clínicas y de las maternales de los recién nacidos, que presentaron hemorragia y aparte eran prematuros y además tenían un bajo peso (2000 gr) coinciden con lo que se tenía esperado en base a la literatura.

Adelantos Clínicos:

Se dice que a pesar de los grandes adelantos y hallazgos clínicos, durante la unidad de cuidados intensivos neonatales, realizados durante décadas, demuestra que los recién nacidos prematuros siguen presentando un elevado riesgo de padecer una hemorragia intracraneal lo que compromete la vida de los recién nacidos, aumentando la mortalidad, y los factores susceptibles como del neuro-desarrollo.

Conclusión:

El impacto del R.N. pretermino es muy grande y a pesar de los datos epidemiológicos (1 de estos pacientes), la mortalidad se ha situado a un 50% de las muertes totales, para que podamos actuar de una forma rápida y evitar su evolución.