

Síndrome de Gilles de la Tourette

Scribd

Este síndrome se caracteriza por movimientos y sonidos involuntarios a los que se les denomina "tics". Estos tics, pueden incluir parpadeos, sacudidas (adridas), curvazos, tos o repetición de palabras. Algunas personas que presentan este trastorno neurológico, pueden decir repentinamente obscenidades.

Los síntomas pueden iniciar de manera repentina entre los 7 y 10 años de edad, llegando a ser más evidente en la adolescencia.

Los tics motrices como pastorear o mover de manera contoneada la cabeza, cuello y hombros aparecen de manera anticipada a los tics ~~de~~ verbales.

Hay que tener en cuenta de que tener un tic no es síntoma de presentar este síndrome, aunque se evaluará si presenta tics de tipo motor y vocal.

Los tics pueden empeorar si el paciente se encuentra a situaciones de estrés y suelen empeorar si está en un ambiente relajado. Pueden los pacientes presentar ataques de ira y escase control de impulsos.

Aún no se ha asignado una causa a este padecimiento ya que no existe una relación exacta con algún gen, aunque no se descarta el componente hereditario y las anomalías en algunas regiones del cerebro.

A los pacientes que presenta este trastorno se les trata con terapia conductual y medicamentos, ya que este trastorno no tiene cura.

Medicamentos: Se utilizan por lo general neurolepticos, los cuales han resultado útiles para tratar los efectos al bloquear a la dopamina como neurotransmisor.

T. Conductual: Si se trata de un paciente en edad temprana de 18 años, se le da una terapia llamada "Reversión de hábitos".