

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Neurología

Resumen:

Corea de Syderham

Docente:

Dr. José Luis Gordillo Guillen

Alumno:

Víctor Eduardo Concha Recinos

Semestre y Grupo:

6° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 03 de Septiembre
de 2021.

"Corea de Sydenham"

Causa:

La corea de Sydenham, es causada por una infección la cual es causada por la presencia de bacterias A. Estreptococos, la cual causa infecciones y fiebre reumática, también se sabe que puede llegar a causar faringitis estreptocócica.

Fisiopatología:

Puede llegar a reaccionar con una parte del cerebro denominada como Ganglios basales, los cuales son estructuras profundas del cerebro, las cuales ayudan a controlar el movimiento, postura y habla.

Población susceptible:

Uno de los signos principales es la fiebre reumática aguda, las personas pueden tener en la actualidad la enfermedad o bien haberla presentado recientemente.

Epidemiología:

Se presenta con mayor frecuencia en niños antes de la pubertad, no se descarta la idea de que puede llegarse a presentar en niños pero con menor frecuencia.

Cuadro Clínico:

Los síntomas podemos mencionar alguno de los siguientes:

- Movimiento Incontrolable / involuntario de manos, brazos, hombros, caras, piernas y tronco
- Movimientos espasmódicos
- Estos desaparecen con el sueño
- Cambios en la escritura
- Pérdida del control de la motricidad
- Manos frías y dedos de los pies.
- Pérdida del control emocional
- Llantos a risa inadecuados al momento

Nota:

Se puede llegar a presentar síntomas de Fiebre reumática, incluyendo: fiebre alta, problemas cardiacos, dolor o inflamación de articulaciones, bultos o erupciones en la piel

Episodio transitorio:

La corea es un episodio transitorio y se debe tranquilizar a los pacientes y las personas en su entorno; se trata de un proceso autolimitado que terminará por desaparecer sin dejar secuelas motoras ni afectar su capacidad intelectual. Excepcionalmente pueden presentar una afectación cardiaca grave, cuando se produce hay que adoptar las mismas pautas de actuación que para la fiebre reumática.