

**Universidad del Sureste**  
**Escuela de Medicina Humana**

**SEMESTRE:**

6° A

**MATERIA:**

NEUROLOGÍA.

**CLAVE:**

1.

**DOCENTE:**

DR. JOSÉ LUIS GORDILLO.

**ALUMNO (A):**

IRIANA YAYLÍN CAMPOSECO PINTO.

COMITÁN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

## Distonía

Contracciones musculares involuntarias lo que causa movimientos de torsión repetidos y posturas anormales que se producen por la contracción muscular simultánea de músculos agonistas y antagonistas.

En la edad adulta las formas más frecuentes afectan la cara, cuello y no suelen tener un curso progresivo. La distonía de inicio en la infancia suele comenzar por las extremidades inferiores y tienen

un curso progresivos  
afectando en pocos años  
a la mayoría de las  
áreas corporales (distonia  
generalizada). Los síntomas  
son las contracciones  
musculares excesivas que  
afecta a una parte o  
varios del cuerpo, aparición  
de posturas anormales  
o sostenidas que mejoran  
con el reposo y desaparecen  
con el sueño.

La distonia puede ser  
un síntoma de otra  
enfermedad o afección como  
Parkinson, lesión cerebral  
traumática, enfermedad de  
Huntington. La distonia puede  
afectar un solo músculo, un  
grupo o todos los músculos.