

UNIDAD I
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

CUADRO COMPARATIVO

Alumno: ADRIANA LIZZEHT SANCHEZ MORALES

DRA. CARMEN HERNÁNDEZ

MEDICINA HUMANA

SÉPTIMO SEMESTRE "A"

CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN EL EMBARAZO

| | |
|----------------|---|
| PIEL | Estrías, diátesis de rectos, hay una hiperpigmentación generalizada (por melanocitos), Varicosidades en extremidades inferiores, vulva y recto. Telangiectasias (cara, tórax y extremidades superiores) |
| HEMATOLÓGICO | Aumento del volumen sanguíneo (32 a 34 semanas) aumento del volumen plasmático, también de la eritropoyetina, pérdida de sangre en el parto (400-800 ml) y cesárea (1000 ml), serie blanca: aumento de leucocitos (30 sem) aumento de neutrófilos, disminución de linfocitos, aumento de monocitos. Coagulación se encuentra activo (hipercoagulabilidad) aumento de los factores XI y XIII, aumento de fibrinógeno (250 a 400 mg/dL a 600 mg/dl) |
| CARDIOVASCULAR | En las primeras 8 sem, >GC (5ta sem), >precarga (10 y 12 sem), >FC (7ma SDG y máximo 30), elevación del diafragma, Desviación del eje eléctrico hacia la izquierda. Cardiomegalia. Desdoblamiento exagerado del primer ruido cardíaco y la aparición de un soplo sistólico, presión sanguínea disminuye, predisposición de trombosis venosa profunda |
| RESPIRATORIO | Elevación del diafragma 4 cm), aumento de los diámetros anteroposterior y transversal, aumentando de 5-7cm la circunferencia torácica y aplana los arcos costales, Ingurgitación capilar de la mucosa nasal, orofaríngea y laríngea, disminución del CO ₂ |
| DIGESTIVO | Por lo general, en el sistema digestivo , el tono y la motilidad están disminuidos, lo que produce un retardo en el tránsito intestinal y en el vaciamiento. Se calcula que un 50% de las embarazadas sufren náuseas y vómitos durante el primer trimestre. Suelen ser matinales y desaparecen al tercer mes. |
| URINARIO | El riñón aumenta ligeramente de tamaño (1 cm) y de peso (50 g), disminución de creatinina y urea en sangre (0.5 y 9 mg/dl), aumento de glucosa, >aminoácidos y proteínas, disminución de ácido úrico, <potasio, >sodio, equilibrio ácido-base (alcalosis) |

| | |
|--------------------|--|
| MUSCULOESQUELÉTICO | Lo más característico es la lordosis progresiva, se trata de un mecanismo compensador del aumento de peso en la parte anterior del cuerpo, es decir, se arquea la columna, estos cambios pueden producir dolores de espalda sobre todo al final del embarazo y una forma de andar característica llamada “marcha de pato”. |
| | |

Fuentes de información:

Williams Obstetricia. 20a edición. Argentina: Editorial Medica Panamericana, 1999, páginas 241-299. 2. **SCHWARCZ R.** Obstetricia. 5° edición