



Universidad del Sureste



Escuela de Medicina

“Caso clinico”

Materia:

Clínica Ginecológica

Docente:

Carmen del Rosario Hernández Velasco

Alumno:

Tarsis Andrea Guillén Narváez

Semestre:

7° “A”

PADECIMIENTO ACTUAL

•Paciente de 24 años de edad, sin antecedentes de patologías previas, gesta 2 parto 1 (su parto fue hace 1 año 6 meses, embarazo de 34 semanas, peso fetal al nacer 2400, actualmente sano), FUM 26 de enero 2021, control prenatal 4 consultas, ingesta de ácido fólico y vitaminas, cursó con infección de vías urinarias y vaginal tratadas, no recuerda el medicamento tomado por 5 días.

•Acude a consulta por presentar dolor en hipogastrio irradiado a cintura, que inició ayer, con salida de flujo tipo moco por vagina, percibe movimientos fetales.

EXPLORACIÓN FÍSICA

•A la exploración consciente, hemodinámicamente estable, cardiopulmonar sin compromiso, abdomen con útero gestante, con presencia de contracciones uterinas 1 en 10 min, feto cefálico, dorso a la izquierda, FCF 146 xmin, al tacto vaginal cérvix central con 2cm de dilatación, 80% de borramiento, amnios íntegro, Tarnier y valsalva negativo, presencia de tapón mucoso, pelvis ginecoide, extremidades íntegras y funcionales.

PREGUNTAS

• **¿Cuál es su diagnóstico?**

Amenaza de parto pretérmino en fase activa

• **¿Qué factores de riesgo para la patología actual encuentras?**

El principal es que presenta una infección vaginal y de vías urinarias, también podría ser un riesgo el que consumió algún fármaco por 5 días y se desconoce cuál sea este, y si ha provocado la amenaza o que esta se complique

• **¿Qué tratamiento darías y porque?**

- Se le recomendaría reposo, pero no estricto, solo limitando algunas actividades con mucho esfuerzo físico, ya que el realizar esfuerzos físicos exagerados puede complicar la situación
- Tocolítico se recomienda ya que estos disminuyen las contracciones uterinas y el tono muscular del miometrio mediante dos mecanismos: disminuyendo las concentraciones del calcio intracelular o incrementando los sistemas adenil-ciclasa o guanilato-ciclasa
- Antibióticos para profilaxis de estreptococos del grupo B, mientras se realiza la prueba para comprobar el agente causal
- En este caso no estaría recomendado el esquema de maduración pulmonar ya que esta paciente tiene 34 semanas de gestación,