

**Nombre del alumno: Cesar Enrique
Utrilla Domínguez**

**Nombre del profesor: Natanael Ezri
Prado Hernández**

Nombre del trabajo: Casos clinicos

Materia: Biología del desarrollo

Grado: Primer semestre

Grupo: "A"



Px femenino de 23 años, con embarazo de 14 SDG por FUM. Ingres a la sala de urgencias por presentar dolor abdominal leve a nivel del hipogastrio, acompaado de sangrado transvaginal escaso. Sin antecedentes patol3gicos de importancia. Al examen ginecol3gico hay presencia de sangre en el canal vaginal y el cuello uterino est3 cerrado y sin cambios. Hb 11.1, leu 6000, plaq 240,000. ¿Cu3l es el dx m3s probable?

- posible amenaza de aborto R/c al sangrado transvaginal y dolor en el abdomen con el hipogastrio.

¿Cu3l es la causa m3s com3n de este diagn3stico?

-ante un sangrado vaginal durante el embarazo, la primera sospecha ser3 una amenaza de aborto y se debe consultar inmediatamente con el m3dico.

¿Cu3l es el siguiente paso en esta paciente?

- mandarla aproximadamente 1 semana o 2 semanas a reposo

Acude a urgencias una paciente de 28 aros con amenorrea de 10 semanas, acude por presentar menorragias, menores que una regla, sin dolor. Le solicita un test de embarazo que es +. A la exploraci3n ginecol3gica se objetivan restos hem3ticos escasos en vagina, no sangrado activo, c3rvix cerrado. En la ecograf3a transvaginal se objetiva una ves3cula gestacional de 18 mm con un embri3n de 3 mm en la que no se objetiva latido card3aco. ¿Cu3l es el diagn3stico?

-la paciente de 28 aros con posibles s3ntomas de un aborto retenido. El feto empez3 a crecer pero se interrumpe su desarrollo normalmente esto se debe a anomal3as gen3ticas por la cantidad de sangrado similar o superior a la menstruaci3n que es lo raro que el embarazo pueda seguir en su curso.

¿Cu3l es el siguiente paso en esta paciente?

- Hacerle una prueba de sangre para asegurar los niveles de las hormonas en el embarazo, hacerle examen de pelvis y c3rvix con la cantidad de sangrado vaginal que tiene la paciente.

-Al obtener los resultados y confirmar el aborto retenido se llevara a cabo una cirug3a para completar la expuls3n del aborto.