



**Nombre de alumno: Francisco miguel
Gómez Mendez**

**Nombre del profesor: ANATANAEL
EZRIL PRADO HERNANDEZ**

Nombre del trabajo: Casos clínicos

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Biología del desarrollo.

Grado: 1

Grupo: A

Px femenino de 23 años ,con embarazo de 14 SDG por FUM .ingresa a la sala de urgencias por presentar dolor abdominal leve a nivel de hipogastrio ,acompañado de sangrado transvaginal escaso . sin antecedentes patológicos de importancia .al examen ginecológico hay presencia de sangre en el canal vaginal y el cuello útero esta cerrado y sin cambios HB11.1 leu6000 `plaq240000 ¿Cuál es el dx mas probable?

*posible amenaza de aborto R/c al sangrado transvaginal y dolor en el abdomen hasta el hipogastrio.

¿Cuál es la causa más común en este diagnóstico?

*ante el sangrado transvaginal durante el embarazo se relaciona a un presunto aborto, y es la primera sospecha a los casos de embarazo.

¿ cual es el siguiente paso en esta paciente?

- Realizarle pruebas de laboratorio para ver las causas de este sangrado , enviarla a reposo por 1 o 2 meses sin esfuerzo fisicos llevar una alimentación sana .

Acude a urgencias una paciente de 28 años con amenorrea de 10 semanas ,acude por presentar menorragias menores que una regla sin dolor ,le solicitan un test de embarazo que es + A la exploración ginecológica se objetiva restos de hemáticos escasos en la vagina ,no sangrado activo .cervix cerrado . en la ecografía transvaginal se objetiva una vesícula gestacional de 18 mm con el embrión de 3mm en la que no se objetiva latidos cardiacos ¿ cual es el diagnostico ? * la paciente de 28 años con posible síntomas de un embarazo síntomas de un posible aborto retenido , el feto empezó a crecer pero se interrumpe su desarrollo normalmente esto se debe a anomalías genéticas por la cantidad de sangrado similar o superior a la menstruación que es lo mas raro que el embarazo pueda seguir en su curso .

¿ cual es el siguiente paso en esta paciente ?

Hacerle una prueba de sangre para a segura los niveles de las hormonas en el embarazo hacerle examen de pelvis y cérvix con la cantidad de sangrado vaginal que tiene la paciente .

*al obtener los resultados y confirmar el aborto retenido se llevara a acabo una cirugía para completar la expulsión del aborto