

**Nombre del alumno: Madrid Sánchez  
Luis Jaime**

**Nombre del profesor: Jiménez Ruiz  
Sergio**

**Nombre del trabajo: control de  
lectura**

**Materia: interculturalidad y salud**

**Grado: primer semestre**

**Grupo: “B”**

## Niveles de atención, de prevención y atención Primaria de la Salud

### Niveles de atención.

Se define como una forma ordenada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población.

- **Primer nivel:** el más cercano a la población, o sea, el de primer contacto, la organización de los recursos que permite resolver las necesidades de atención básica y más frecuentes, que pueden resultar por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación.

- **segundo nivel:** se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la mantención de la salud en la medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia, cirugía general y psiquiatría.

- **Tercer nivel:** se reserva para la atención de problemas poco prevalentes, se refiere a la atención de patologías poco regulares o complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. su ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un país, o gran parte de él. En este nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas de salud que se plantean.

## sistema de referencia y contrareferencia.

-Referencia: proceso administrativo-asistencial mediante el cual un establecimiento de salud transfiere la responsabilidad del cuidado de la salud de un paciente o el procedimiento de una prueba diagnóstica, a otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva.

-contrareferencia: proceso administrativo-asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de referencia, una vez resuelto el problema de salud devuelve la responsabilidad del paciente al establecimiento referente.

## Niveles de complejidad.

-primer nivel: refiere a policlinicas, centros de salud, consultorios y otros, donde asisten médicos familiares y comunitarios, pediatras, generales y ginecólogos.

-segundo nivel: hospitales con especialidades como medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general, psiquiatría, etc.

-tercer Nivel: uso intenso de recursos humanos y equipamiento, con la realización de procedimientos complejos y uso de alta tecnología.

## Niveles de prevención:

-prevención primaria: orientada a evitar la aparición de una enfermedad o problema de

salud mediante el control de los factores casuales y los factores predisponentes o condicionantes.

- **prevención secundaria:** destinada al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, de enfermedades lo más precozmente posible.

- **prevención terciaria:** acciones relativas a la recuperación ad integrum de la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y la rehabilitación.

### **Atención primaria de la salud (APS)**

Asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos científicamente fundamentados y socialmente aceptados, puesta al alcance de todos los individuos de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Esta no es atención de segunda clase destinada a comunidades vulnerables socioeconómicamente, si no que es una estrategia dirigida a todos los sectores sociales sin distinción.

## Bibliografía

Vignolo, Julio, Vacarezza, Mariela, Álvarez, Cecilia, & Sosa, Alicia. (2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. *Archivos de Medicina Interna*, 33(1), 7-11. Recuperado en 29 de noviembre de 2021, de [http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1688-423X2011000100003&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003&lng=es&tlng=es).