



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Medicina Humana

Francisco Ignacio Ordoñez Salvatierra

Basilio Robledo Miguel

Morfología

Semestre 1º "A"

Mapa conceptual

15/10/2021

Tapachula, Chiapas.

Periné

El periné hace referencia a un comportamiento superficial del organismo, limitado por la abertura inferior de la pelvis y separado de la cavidad pélvica por la fascia que cubre la cara del diafragma pélvico.

Las estructuras osteofibrosas que forman los límites del periné son

- * sínfisis del pubis, anteriormente
- * Las ramas isquiopúbicas (las ramas púbicas inferiores y las ramas isquiáticas combinadas), anterolateralmente

El cuerpo perineal

Es una masa irregular de tamaño y consistencia variables que contiene fibras colágenas y elásticas, y músculo esquelético y liso.

Triángulo urogenital

En la mujer, la capa adiposa del tejido subcutáneo del periné forma la masa de los labios mayores y el monte del pubis, y se continúa, anterior y superiormente, con la capa adiposa del tejido subcutáneo del abdomen.

En el hombre la capa adiposa es mucho menor en el triángulo urogenital, y es sustituida por completo en el pene y en el escroto por músculo liso (Dartos).

Triángulo Anal

Las fosas isquioanales, situadas a ambos lados del conducto anal, son grandes espacios cuneiformes, tapizados por fascias, entre la piel de la región anal y el diafragma pélvico.

Cada fosa isquioanal está limitada

- * Lateralmente, por el isquion y la porción inferior del obturador interno
- * Medialmente, por el esfínter externo del ano, con una pared medial superior o techo
- * Posteriormente, por el ligamento sacrotuberoso y el glúteo mayor
- * Anteriormente por los cuerpos de ambos pubis, inferiormente al origen del músculo puborrectal.