


Evaluación la hidratación del bebé con diarrea	A	B	C
1.Pregunte por: Sed Orina	Normal Normal	Mas de lo normal Poca cantidad, oscura	Excesiva No orinó durante 6 hrs
2.Obserbe: Aspecto, ojos, boca, lengua y respiración	Alerta, normales, húmedas, normal	Irritado o decaído, hundidos, secas mas rápido de lo normal	Deprimido o comatoso , muy hundidos llora sin lágrimas, muy secas sin saliva, muy rápida y profunda
3.Explore: Elasticidad de la piel Fontanela: pulso y llenado capilar	El pliegue se deshace con rapidez, normal, normal, <2 seg	El pliegue se deshace con lentitud, hundida se palpa, 3-5 seg.	El pliegue se deshace muy lentamente >2 seg, muy hundida se palpa y observa, muy rápido, fino o no se palpa , >5 seg
4. Decida	No tiene deshidratación	1 o mas signos es deshidratación	> o = 2 Signos es deshidratación grave, los marcado en negro representan un choque hipovulémico
5.Tratamiento	Aplicar plan A para prevenir	Aplicar plan B	Aplicar plan C , VO, comenzar EV si hay shock, si hay vómitos >4 en 1 hr, íleo, convulsiones



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN para tratamiento en las postas:

- Menores de 2 meses con algún grado de deshidratación.
- Deshidratado grave: vómitos incoercibles, shock, íleo, convulsiones.