

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

A adolescentes 10-19 años.

Vacuna	Enfermedad que previene	Dosis		Edad y frecuencia	Técnica	C.1	Vigilancia
Hepatitis B Revacinado	Hepatitis B	Primera		Apartir de los 11 años	IM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipersensibilidad ✓ Enfermedad ✓ Fiebre ✓ Tx de inmunopar. ✓ Personas transfundidas 	Corva de prevalencia
		Segunda		4 semanas después de la 1ª			
Td	Tétanos y Difteria	Esquema completo	Primerizo	11 años	IM 3 dosis / msc derecho. 18 meses se aplica en el deltoides o brazo izq.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipersensibilidad ✓ Padecimientos febriles ✓ Ent. Graves ✓ Menores de edad (con transfusiones) 	Efectos Adversos
		Esquema incompleto	1ª	Dañicid			
			Segunda	1 mes de la 1ª puesta			
			Tercera	12 meses después de la 1ª			
Td pa	Tétanos, difteria y tos ferina	Única		Apartir de semana 20° Embarazo	IM Profunda.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipersensibilidad ✓ Fiebre ✓ Transfusión 	Efectos adversos.
Influenza estacional	Influenza	Única		Cual trimestre de embarazo	IM	Niños - Lactantes. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipersensibilidad ✓ Fiebre > 38.5°C ✓ Px-Guillain Barre' 	Efectos adversos
SR Esquema incompleto	Sarampión y Rubéola	Apartir de 12 años sin antecedente vacunal	1°	Primer contacto.	Subcutánea área superior externa del tríceps - Brazo izq.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipersensibilidad ✓ Inf. febriles ✓ Tx corticosteroides ✓ Cáncer ✓ Inmunodeficiencias ✓ Transfusión. 	Efectos adversos
		Esquema incompleto	2°	A 4 semanas después de la 1ª			
			3° Dosis única	Primer contacto.			
VPH	Infección por Virus de Papiloma Humano	Primera		Mujeres - 5° año de primaria y 11 años	IM Deltoides	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipersensibilidad - laudera 	Efectos adversos
		Segunda		6 meses después de la 1ª			
		Tercera		60 meses después de Primera.			

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Mujeres

20-59 años.

Vacuna	Enfermedad que previene	Dosis		Edad	Técnica	C.I	Vigilancia
SR No vacunadas o esquema incompleto 39 años	Sarampión y Rubéola	Sin antecedente vacinal	1era	Primer contacto	Deltoides IM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipersensibilidad ✓ Padecimientos febriles ✓ Tx-Corticosteroides ✓ Cáncer ✓ Inmunodeficiencia 	Efectos adversos
		Esquema incompleto	Segunda	4-5 años después de la 1ra			
			Dosis única	Primer contacto.			
Td	Tétanos y Difteria	Esquema completo		Cada 10 años Refuerzo	IM muslo derecho	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipersensibilidad ✓ Fiebre ✓ Enf. Ceraces ✓ < 18 → Transferón 	Efectos adversos
		Esquema incompleto o no documentado		Dosis inicial 1era			
				1er mes - 1ra o 2da			
Tdpa	Tétanos, Difteria y tos ferina	Única		Apartir de la sem. 20 de embarazo	IM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipersensibilidad ✓ Fiebre ✓ Transfusión 	Efectos adversos
Influenza estacional	Influenza	Personas con factores de riesgo		Anual	IM	<ul style="list-style-type: none"> Niño-lactantes ✓ Fiebre > 38.5°C ✓ Sx - Guillain Barre' 	Efectos adversos
		Embarazadas	Única	Cualquier trimestre			

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Hombre 20-59 años

Vacuna	Enfermedad que previene	Dosis		Edad	Técnica	C.I	Vigilado
S2 La vacunación esquema incompleto en 39 años	Sarampión y Rubéola	Sin antecedente viral	Primera	Primer contacto	IM Deltoides	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipersensibilidad ✓ Inf. Febriles ✓ Tx-corticosteroides ✓ Cáncer ✓ Inmunodeficiencias ✓ Transfusión 	Efectos adversos.
		Esquema incompleto	Segunda	4 semanas después de 1ra			
			Dosis única	Primer contacto			
Td	Tétanos y Difteria	Esquema completo	Refuerzo	Cada 10 años	IM	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hipersensibilidad ✓ P. Febriles ✓ Ent. Graves ✓ < 18 años con transfusión 	Efectos adversos
		Esquema incompleto	1ra	Dosis inicial			
			2da	1 mes después de la 1ra			
3ra	12 meses después de la 1ra						
Influenza estacional	Influenza	Personas con factores de riesgo		Anual	IM	<ul style="list-style-type: none"> Niño-lactantes ✓ Inf. Febriles ✓ Fiebre > 38.5°C ✓ Px → Guillain Baré 	Efectos adversos