

PRODRÓMICA

- ↓ social
- ↓ funcionamiento
- ↑ irritabilidad



PSICÓTICA

- Alteraciones de la percepción
- Delirios
- Desordenes del pensamiento



FASES DE LA ESQUIZOFRENIA



Residual → Inter episódicos.

- ↓ afecto
- Abstinencia social
- Alteración del pensamiento



DEFINICIÓN


- Enfermedad mental crónica cuyas manifestaciones clínicas se relacionan con ciertas funciones del cerebro.
- Se caracteriza por alteraciones o distorsiones en el pensamiento, percepción, afecto y conducta.

CUADRO CLÍNICO

DISFUNCIONES



COGNITIVO



CONDUCTUAL



EMOCIONAL

TRATAMIENTO

FARMACOLÓGICO + TERAPIA
(Habilidades sociales, autosuficiencia y actuación apropiada en publico).

MEDICAMENTOS ANTIPSICÓTICOS	
FÁRMACO	INDICACIONES
Clozapina	Psicosis
Levopromazina	Psicosis con ansiedad o agitación extrema
Halopridol	Psicosis neuroleptica
Olanzapina	Esquizofrenia
Quetiapina	Psicosis
Trifluoperazina	Esquizofrenia, ansiedad y psicosis crónica.
Risperidona	Esquizofrenia crónica
Ziprasidona	Psicosis
Flupentixol	Esquizofrenia crónica y crisis paranoica.

SEDANTES	
FÁRMACO	INDICACIONES
Clonazepam	Epilepsia
Alprazolam	Ansiedad, trastorno de pánico
Difenhidramina	Reacciones de hipersensibilidad inmediata.

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS SÍNTOMAS EXTRAPIRAMIDALES	
FÁRMACO	INDICACIONES
Biperideno	Parkinsonismo, cinetosis

SÍNTOMAS POSITIVOS (Vía mesolímbica)



DELIRIOS



ALUCINACIONES

Diagnóstico
≥2 criterios, la mayor parte de tiempo >1 mes)

SÍNTOMAS NEGATIVOS (Vía mesocortical (más difícil Tx))



ABULÍA



APATÍA



ALOGÍA



PÉRDIDA DE INTERÉS



ANHEDONÍA



AISLAMIENTO SOCIAL

SÍNDROMES ESQUIZOFRENICOS



SX CAPGRAS: delirio impostores, han reemplazado al familiar.



LICANTROPÍA: Delirio de ser un hombre lobo.



HEUTOSCOPIA: Delirio de tener un doble.