

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ,  
CHIAPAS**



**UNIDAD III**

**MEDICINA FORENSE**

***MALTRATO INFANTIL Y  
ABORTO***

**DR. ELFREDO LOPEZ**

**DEBORA NIETO SANCHEZ**

## **INDICE**

Introducción \_\_\_\_\_ 2

### ***Maltrato infantil***

Definición \_\_\_\_\_ 3

Magnitud del problema \_\_\_\_\_ 3

Consecuencias del maltrato \_\_\_\_\_ 3-4

Factores de riesgo \_\_\_\_\_ 4

    Factores del niño \_\_\_\_\_ 4

    Factores de los padres o cuidadores \_\_\_\_\_ 4

    Factores relacionales \_\_\_\_\_ 5

    Factores sociales o comunitarios \_\_\_\_\_ 5-6

Prevención \_\_\_\_\_ 6

### ***ABORTO***

Definición \_\_\_\_\_ 7

#### **Tipos**

    Aborto espontaneo \_\_\_\_\_ 7

        Causas \_\_\_\_\_ 7

    Muerte fetal \_\_\_\_\_ 7-8

    Aborto incluido \_\_\_\_\_ 8

        Aborto medico \_\_\_\_\_ 8

        Aborto quirurgico \_\_\_\_\_ 8

Conclusiones \_\_\_\_\_ 9

Bibliografía \_\_\_\_\_ 10

## INTRODUCCION

El maltrato infantil como el aborto son temas que van de la mano ya que a causa del maltrato infantil buscamos que el aborto sea la solución en algunos casos.

Trataremos de explicar cada definición para comprender la situación en la que hoy en día vivimos.

## **MALTRATO INFANTIL**

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.

### **➤ Magnitud del problema**

El maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. A pesar de las encuestas nacionales recientes en varios países de ingresos bajos y medianos, faltan todavía datos acerca de la situación actual en muchos países.

El maltrato infantil es complejo y su estudio resulta difícil. Las estimaciones actuales son muy variables, dependiendo del país y del método de investigación utilizado. Dichas estimaciones dependen de:

- las definiciones de maltrato infantil utilizadas;
- el tipo de maltrato infantil estudiado;
- la cobertura y la calidad de las estadísticas oficiales;
- la cobertura y la calidad de las encuestas basadas en los informes de las propias víctimas, los padres o los cuidadores

### **➤ Consecuencias del maltrato**

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como:

- actos de violencia (como víctimas o perpetradores);
- depresión;
- consumo de tabaco;
- obesidad;
- comportamientos sexuales de alto riesgo;
- embarazos no deseados;
- consumo indebido de alcohol y drogas.

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el maltrato puede contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual.

#### ➤ **Factores de riesgo**

Se han identificado varios factores de riesgo de maltrato infantil. Aunque no están presentes en todos los contextos sociales y culturales, dan una visión general que permite comprender las causas del maltrato infantil.

- Factores del niño

No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se les podrá culpar del maltrato. No obstante, hay una serie de características del niño que pueden aumentar la probabilidad de que sea maltratado:

- la edad inferior a cuatro años y la adolescencia;
- el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres;
- el hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales.

- Factores de los padres o cuidadores

Hay varias características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas:

- las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido;
  - el hecho de no cuidar al niño;
  - los antecedentes personales de maltrato infantil;
  - la falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil;
  - el consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la gestación;
  - la participación en actividades delictivas;
  - las dificultades económicas.
- Factores relacionales

Hay diversas características de las relaciones familiares o de las relaciones con la pareja, los amigos y los colegas que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas:

- los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia;
  - la ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia;
  - el aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos;
  - la pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño.
- Factores sociales y comunitarios

Hay diversas características de las comunidades y las sociedades que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas:

- las desigualdades sociales y de género;
- la falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y las instituciones;
- los niveles elevados de desempleo o pobreza;
- la disponibilidad fácil del alcohol y las drogas;
- las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles;

- las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada sexo;
- las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan malas condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades socioeconómicas.

### ➤ **Prevención**

La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Los programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. Entre ellos se encuentran:

- las visitas domiciliarias de enfermeras para ofrecer apoyo, formación e información;
- la formación de los padres, generalmente en grupos, para mejorar sus aptitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos sobre el desarrollo infantil y alentarlos a adoptar estrategias positivas en sus relaciones con los hijos, y
- las intervenciones con múltiples componentes, que generalmente incluyen el apoyo a los padres y su formación, la educación preescolar y la atención al niño

## **ABORTO**

El aborto es la pérdida del embarazo "en un momento en el que el feto o embrión no es viable, es decir, que no es capaz de sobrevivir fuera del útero materno".

Existen diferentes tipos de aborto o interrupción del embarazo:

### ➤ **Aborto espontáneo**

El aborto espontáneo es aquel que no se da de forma intencionada, sino a causa de una serie de complicaciones en el feto o en la madre. Generalmente ocurre durante las 12 primeras semanas de gestación y no precisa de ningún tipo de intervención quirúrgica, pero a partir de la semana 20 pasa a denominarse muerte fetal.

- **Causas de un aborto espontáneo**

Hay que tener en cuenta que más de la mitad de los óvulos fecundados no son viables y se expulsan de forma espontánea; para la mayoría de las mujeres esto pasa desapercibido ya que los únicos signos que se dan de este hecho es un sangrado ligeramente mayor del habitual durante la menstruación.

Las causas de un aborto espontáneo pueden ser varias, aunque lo más común es que se deba a problemas en los cromosomas de los embriones.

### ➤ **Muerte fetal**

Cuando el aborto ocurre con posterioridad a las 20 primeras semanas de gestación se conoce como muerte fetal y en estos casos siempre se requiere de cirugía para extraer el feto del útero. Es un caso extraordinario, pues sólo ocurre en menos del 1% de los embarazos.

Los primeros síntomas de una muerte fetal se suelen mostrar al detectar un menor movimiento del bebé o espasmos y dolores en la pelvis, la espalda o el vientre. Factores como el tabaquismo, la hipertensión arterial o la diabetes pueden aumentar las probabilidades de que esto ocurra, pero también se puede producir por

preclampsia y eclampsia, enfermedades infecciosas, anomalías congénitas graves, posmadurez o lupus, entre otras patologías.

### ➤ **Aborto inducido**

El aborto inducido es aquel que se realiza por propia voluntad de la mujer. Hay dos formas de interrumpir un embarazo:

- Aborto médico

Se toma un medicamento para llevar a cabo el aborto. Sólo se puede hacer durante las nueve primeras semanas de embarazo.

- Aborto quirúrgico

Se realiza una cirugía para extraer el feto. Existen dos métodos frecuentes de aborto quirúrgico por aspiración con vacío manual, que se puede hacer durante las 12 primeras semanas de embarazo y consiste en la extracción de todo el tejido que contiene el útero con un instrumento succionador de manera manual y la dilatación y evacuación.

## CONCLUSIONES

Estos temas pueden estar relacionados ya que tienen similitudes en cuestión de soluciones, es decir, al tener un aborto de algo no planeado podremos prevenir el maltrato infantil o bien, con el aborto podemos prevenir el aumento de la población. La explotación infantil es causa de la sobrepoblación, comúnmente vemos esto en familias de bajos recursos.

Podemos prevenir estas dos situaciones mejorando nuestro sistema de educación sexual donde sobresalgan los temas de reproducción como protección. No solo evitaremos esto, también podemos evitar ETS.

## BIBLIOGRAFIA

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>

<https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/embarazo/diccionario/aborto.html>