

# Farmacos del dolor neuropático

## PRIMERA LINEA

LIDOCAINA 5%	APLICAR A LA ZONA DOLOROSA	HASTA 3 PARCHES AL DIA	IRRITACION CUTANEA
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS	PO	10-100 MG AL ACOSTARSE EN LA NOCHE	CAMBIOS COGNITIVOS, OJOS Y BOCA SECOS, RETENCION URINARIA, ESTREÑIMIENTO
GABAPENTINA	PO	300-1200 MG C/8 H	CAMBIOS COGNITIVOS, SEDACION, EDEMA PERIFERICO
PREGABALINA	PO	50 - 100 MG C/8 H	CAMBIOS COGNITIVOS, SEDACION, EDEME PERIFERICO
DULOXETINA	PO	30 - 60 MG C/24 H	CAMBIOS COGNITIVOS, SEDACION, OJOS SECOS, DIAFORESIS, NAUSEAS, DIARREA, ESTREÑIMIENTO

# Farmacos del dolor neuropático

## SEGUNDA LINEA

CARBAMAZEPINA

PO

200-400 mg c/6-8 h

Cambios cognitivos, mareo, leucopenia, disfunción hepática

FENITOINA

PO

200-400 mg al acostarse en la noche

Cambios cognitivos, mareo, leucopenia, disfunción hepática

VANLAFAXINA

PO

37.5-150 mg al acostarse en la noche

Astenia, transpiración, náusea, estreñimiento, anorexia, vómito, somnolencia, boca seca, mareo, nerviosismo, ansiedad, temblor y visión borrosa, así como eyaculación y orgasmo anormales e impotencia

TRAMADOL

PO

50 mg c/6 h

Cambios cognitivos, molestia GI

## TERCERA LINEA

MEXILETINA

PO

200-300 mg c/8 h

Arritmias

# Farmacos del dolor neuropático

