

Fármacos para el dolor neuropático

Primera línea

- Lidocaína
 - **Vía:** Aplicar por zona dolorosa
 - **Dosis:** 3 parches al día
 - **Efectos adversos:** irritación cutánea
- Antidepresivos tricíclicos
 - **Vía:** PO
 - **Dosis:** 10-100 mg por las noches al acostarse
 - **Efectos adversos:** Cambios cognitivos, ojos y boca secos, retención urinaria, estreñimiento
- Gabapentina
 - **Vía:** PO
 - **Dosis:** 300- 1200 mg c/8h
 - **Efectos adversos:** Cambios cognitivos, sedación, edema periférico
- Pregabalina
 - **Vía:** PO
 - **Dosis:** 50-100 mg c/8h
 - **Efectos adversos:** Cambios cognitivos, sedación, edema periférico
- Duloxetina
 - **Vía:** PO
 - **Dosis:** 30-60 mg c/24h
 - **Efectos adversos:** Cambios cognitivos, sedación, ojos secos, diaforesis, náusea, diarrea, estreñimiento

Fármacos para el dolor neuropático

Segunda línea

- carbamazepina

- **Vía:** PO
- **Dosis:** 200-400 mg c/6-8h
- **Efectos adversos:** Cambios cognitivos, mareo, leucopenia, disfunción hepática

- Fenitoína

- **Vía:** PO
- **Dosis:** 200-400 mg por las noches antes de acostarse
- **Efectos adversos:** Cambios cognitivos, mareo, disfunción hepática

- Venlafaxina

- **Vía:** PO
- **Dosis:** 37.5 -150 mg por las noches antes de acostase
- **Efectos adversos:** Astenia, transpiración, náusea, estreñimiento, anorexia, vómito, somnolencia, boca seca, mareo, nerviosismo, ansiedad, temblor y visión borrosa, así como eyaculación y orgasmo anormales e impotencia

- Tramadol

- **Vía:** PO
- **Dosis:** 50 mg c/6h
- **Efectos adversos:** Cambios cognitivos, molestia GI

