

LESION MEDULAR

Síndrome	Definición	Etiología	Características clínicas
<i>BROWN-SEQUARD/ HEMISECCIÓN MEDULAR</i>	Interrupción de las vías ascendentes y descendentes de una hemimédula.	<ul style="list-style-type: none"> • Traumatismos penetrantes. • Lesiones extramedulares 	<ul style="list-style-type: none"> • Paresia espástica • Alteración de la sensibilidad profunda vibratoria-posicional • Afección motora flácida a nivel lesiona • Alteración de la sensibilidad superficial termo-algésica
<i>CENTRO-MEDULAR</i>	Lesión que afecta a la sustancia gris central y a tractos espinotalámicos que se cruzan en el centro medular.	<ul style="list-style-type: none"> • Seringomelia • Traumatismo • Vascular • Tumoral 	<ul style="list-style-type: none"> • Paresia arrefléxica del nivel lesional • Paresia espástica distal • Alteración de la sensibilidad superficial termo-algésica • Se conserva la sensibilidad profunda vibratoria posicion
<i>MEDULAR ANTERIOR</i>	Lesión medular incompleta que se caracteriza por una lesión motora asociada a signos piramidales con conservación.	<ul style="list-style-type: none"> • Disección y cirugía de aorta. Aterosclerosis. • Fractura-dislocación espinal • Vasculitis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Paresia o tetraparesia dependiendo del nivel lesivo • Alteración de la sensibilidad superficial termo-algésica