



Universidad del Sureste
Campus Tuxtla Gutiérrez

“Dolor Neuropático”

Medicina Física y de Rehabilitación

Dra. Mónica Gordillo Rendón

Br. Viridiana Merida Ortiz

Estudiante de Medicina

5to Semestre

17 de noviembre de 2021, Tuxtla Gutiérrez Chiapas

DOLOR NEUROPÁTICO

Primera línea

Lidocaína 5%, parches

- Vía: Aplicar a la zona dolorosa
- Dosis: Hasta 3 parches al día
- Efectos contralaterales: Irritación cutánea
- Presentación: Parches

Antidepresivos tricíclicos

- Vía: PO
- Dosis: 10-100 mg al acostarse en la noche
- Efectos colaterales: Cambios cognitivos, ojos y boca secos, retención urinaria, estreñimiento.

Gabapentina

- Vía: PO
- Dosis: 300-1200mg c/8 h
- Efectos contralaterales: Cambios cognitivos, sedación, edema periférico

Pregabalina

- Vía: PO
- Dosis: 50-100mg c/8 h
- Efectos contralaterales: Cambios cognitivos, sedación, edema periférico

Duloxetina

- Vía: PO
- Dosis: 30-60mg c/24 h
- Efectos contralaterales: Cambios cognitivos, sedación, ojos secos, diaforesis, náusea, diarrea, estreñimiento

Carbamazepina

- Vía: PO
- Dosis: 200-400 mg c/6-8h
- Efectos contralaterales: Cambios cognitivos, mareo, leucopenia, disfunción hepática

Según línea

Fenitoína

- Vía: PO
- Dosis: 200-400 mg al acostarse en la noche
- Efectos contralaterales: Cambios cognitivos, mareo, disfunción hepática

DOLOR NEUROPÁTICO

