

CARACTERISTICAS DE LOS SINDROMES MEDULARES

NOMBRE DE LOS SINDROMES MEDULARES	CARACTERISTICAS		
<p>BROWN-SEQUARD</p>	<p>Consiste en la Hemisección de la médula espinal. Usualmente se presenta como resultado de un trauma penetrante, su incidencia es de 2 a 4% en lesiones traumáticas de la médula espinal.</p>	<p>suele estar acompañada de debilidad muscular, parálisis, dolor, hemiparesia, hemiplejía, atrofia muscular, déficit en la propiocepción, hipoestesia, hipoalgesia, pérdida de la sensibilidad.</p>	<p>El tratamiento de elección es laminectomía o hemilaminectomía, discectomía anterior sin fusión intersomática y discectomía anterior o corporectomía con fusión intersomática. La mayoría de los casos tratados con discectomía anterior y fusión intersomática presentan recuperación completa o con déficit residual menor en algunos casos</p>
<p>CENTRO-MEDULAR</p>	<p>Es una forma de lesión incompleta de la columna vertebral (en la</p>	<p>Dolor de espalda intenso o presión en el cuello, la cabeza o la espalda. Debilidad, descoordinación o parálisis en cualquier</p>	<p>Ocurre con mayor frecuencia entre personas mayores con</p>

CARACTERISTICAS DE LOS SINDROMES MEDULARES

cual no se reciben algunas de las señales del cerebro al cuerpo), caracterizada por la discapacidad en los brazos, las manos y, en menor grado, en las piernas.	parte del cuerpo. Entumecimiento, hormigueo o pérdida de sensibilidad en las manos, los dedos, los pies o los dedos de los pies.	espondilosis cervical que tienen una lesión de hiperextensión, puede producirse en personas de cualquier edad y puede estar asociado con diversas etiologías, mecanismos de lesión y factores predisponentes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARACTERISTICAS DE LOS SINDROMES MEDULARES

MEDULAR ANTERIOR

Caracterizado por paraplejia y pérdida disociada de la sensibilidad al dolor y temperatura. La función de la columna posterior, vibración y propiocepción, está conservada. Se da por infarto de la médula en el territorio irrigado por la arteria espinal anterior.

Disfunción de todos los tractos excepto de las columnas posteriores; por lo tanto, respeto de la sensación de posición y de vibración

Las lesiones medulares representan un porcentaje importante de discapacidad en la población mundial. Es esencial definir el tipo de lesión que se presenta con un examen físico completo y una resonancia magnética siendo el mejor método para visualizar tejido medular

Podrían usarse medicamentos para controlar algunos de los efectos de la lesión de la médula espinal. Estos comprenden medicamentos para controlar el dolor y la espasticidad muscular, así como medicamentos que puedan mejorar el control de la vejiga, el control del intestino y el funcionamiento sexual.