



Fuente: Elaboración propia con base en OIT, "La seguridad en el trabajo", Ginebra, 2003.



**Principales causas de mortalidad por causa de trabajo en el mundo**

Se calcula que del 50% al 70% de la fuerza laboral de los países en desarrollo está expuesta a:

Estadística de Riesgos de Trabajo en Mexico

Enfermedades mas frecuentes en Mexico IMSS

# EPIDEMIOLOGÍA LABORAL EN EL MUNDO

Afecciones respiratorias. 9.8 % implica desde resfriados, bronquitis, enfisema, asma, pulmonía, neumonía, debido a cambios de temperaturas, trabajar bajo temperaturas extremas.

**Neumocomiosis.**  
Se trata de un conjunto de enfermedades

**Hipoacusia**  
Se presenta en el 32.2% de la población trabajadora

| Patología                    | Descripción   | Porcentaje 2015 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Hipoacusia                   | Pérdida gradual de la capacidad auditiva                              | 14.9%           |
| Dorsopatias                  | Enfermedades no inflamatorias   | 10.3%           |
| Neumoconiosis                | Inflamación del aparato respiratorio por polvos minerales o vegetales | 9.2%            |
| Ojos y anexos                | Traumatismos o exposición a radiaciones                               | 933 casos       |
| Intoxicaciones               | Exposición a plaguicidas  | 917 casos       |
| Síndrome del Túnel del Carpo | Tipo de actividad o por uso de herramientas                           | 540 casos       |
| Dermatitis de contacto       | Exposición a químicos   | 1.8%            |

Enfermedades gastrointestinales.

estres

