



Vías de Administración de los Fármacos

Vía Oral

Inyectables

Vía Sublingual

Vía Rectal

Vía Vaginal

Vía Ocular

Vía ótica

Vía Nasal

Vía Inhalatoria

Nebulizaciones

Vía Cutánea

Vía Transdérmica

Tracto Digestivo

Subcutáneas

Intramuscular

Intravenosa

Intratecal

Bajo la Lengua

Efecto Rápido

Conducto Anal, Rectal

Efecto Rápido

Conducto Vaginal

Absorción Lenta

Boca, Estómago y Intestino Delgado

Bajo la Piel

Fármacos Proteicos

Músculo

Volumen del Líquido +

Vena

Espacio de la Médula Espinal

Efecto rápido

Metadona, haloperidol

Antebrazo, Muslo o Nalga

Dosis Individuales

Infusión Intravenosa

Ojos

Efecto local

No Tienen una Buena absorción

Conducto Auditivo Externo

Efecto Local

Conducto Nasal

Absorción Rápida

Conducto Traqueal y Pulmones

Atomizadores

Absorción Rápida

Tráquea y Pulmones

Uso de Dispositivos Especializados

Absorción Rápida

Efecto Local

Sustancias Inactivas

Absorción Lenta

Parches

Ungüentos, Cremas, Etc.