

Investigacion

Polihidramnios: Es la acumulacion excesiva de liquido amniotico, que es el liquido que rodea al bebe en el utero durante el embarazo. Esto ocurre alrededor del 1 o 2 porciento de los embarazos.

Oligohidramnios: Es la disminucion del liquido amniotico y puede estar asociada a malformaciones fetales ocurre cuando el volumen liquido en el saco amniotico es demasiado bajo.

Ruptura prematura de membranas: Se manifiesta como la perdida del liquido amniotico que rodea al feto en cualquier momento antes de que comience el parto.

Cistitas amnióticas: Es un complejo de anomalias congénitas por alteración de un proceso de desarrollo anormalmente normal.

Divertículos: Es una afección caracterizada por la aparición de pequeños sacos inflamados en el tracto digestivo. Es común en las personas mayores de 40 años.

Fistula uracal: Es una cirugía para corregir un defecto de la vejiga, se extirpa el uraco persistente y se cierra la abertura de la vejiga.

Investigación

Viñones en hernadura: Es una anomalía congénita cuyo desarrollo se produce durante el desarrollo fetal, siendo el resultado de la fusión de los extremos inferiores de los dos viñones adaptando la forma de U, es por ello que recibe el nombre de viñon en hernadura.

Implantación baja de la placenta: Es la ~~anormal~~ implantación de la placenta sobre o cerca del orificio cervical interno, suele afectarlas a aquellas mujeres que fuman.

Placenta previa: Es una afección grave que ocurre durante el embarazo cuando la placenta se adhiere profundamente a las paredes uterinas.

Mola hidatiforme: Es el resultado de la fertilización anormal de un ovocito. Esto resulta en un feto anormal.

Mola invasiva: Es una eventual complicación de la mola hidatiforme. Se manifiesta por una penetración profunda de las vellosidades coriónicas con degeneración hidatiforme y estructuras trofoblásticas dentro del miometrio o invasión de los vasos uterinos.

Atarix umbilical única

Atarix umbilical única: es la ausencia de la vena umbilical izquierda o derecha y sus factores de riesgo son el embarazo único.

Cordon umbilical corto: Es una malformación congénita incompatible con vida, que se caracteriza por la presencia de defectos murales de pared abdominal anterior.

Evo laeso de cordon: Es una complicación que ocurre antes o durante el parto del bebé. El cordon puede luego quedar atorado contra el cuerpo del bebé.

Circulo de cordon: Es una complicación peligrosa en el embarazo y en el parto, en la que el cordon umbilical se envuelve alrededor del cuello del feto.