

07-08-21

Embarazo ectópico. Un óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, más frecuentemente en una de las trompas de Falopio. No es posible que un embarazo sobreviva fuera del útero. También se puede implantar en: el lugar donde su trompa de Falopio se une a su útero, en uno de sus ovarios, en el cuello de su útero (cerviz), en el abdomen. El embarazo ectópico generalmente se presenta porque las trompas de Falopio se han dañado.

Aborto. Interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente.

Placenta previa. Complicación que se produce cuando la placenta cubre la abertura en el cuello del útero de la madre, puede provocar un sangrado grave durante el embarazo y el parto.

Placenta accreta. Afección grave que ocurre durante el embarazo cuando la placenta se adhiere profundamente a las paredes uterinas. Esto puede causar una pérdida de sangre grave luego del parto. Puede producirse sangrado vaginal durante el tercer trimestre, también puede causar nacimiento prematuro.

Placenta percreta. La placenta se adhiere y crece a través del útero, extendiéndose en direcciones a los órganos que son cercanos, como la vagina.

Placenta increta. La placenta se adhiere aún con más profundidad en la pared muscular del útero.

Isoinmunización materno fetal. Presencia de anticuerpos maternos dirigidos contra antígenos presentes en los glóbulos rojos fetales.