

## Formación de diafragma.

Causa: Se produce a causa del desarrollo anormal del diafragma mientras se forma al feto.

### Diagnostico y tratamiento:

Se requiere cirugía, la cual se practica para colocar los órganos abdominales en la posición apropiada y reparar la abertura en el diafragma.

## Hernia diafragmática Congénita.

Causa: Se cree que algunos casos de esta afección podrían ser causados por anomalías en los genes del bebé.

### Diagnostico y tratamiento:

Se necesita una operación poco después del nacimiento del bebé.

## Hernia hiatal:

### Causa:

Se produce cuando la parte superior del estómago se hincha y sobresale a través del diafragma dentro de la cavidad torácica.

### Diagnostico y tratamiento:

Algunos medicamentos o cirugía.

## Hernia de Bochdalek.

### Causa:

Se produce por una alteración en el desarrollo embriológico.

### Diagnostico y tratamiento:

Consiste en la reducción quirúrgica de la herniación en la cavidad abdominal y en la reparación del defecto diafragmático.

## Hernia de Morgagni:

### Causa:

Causada por un defecto diafragmático localizada en la parte anterior.

### Diagnostico y tratamiento:

Es siempre quirúrgico, independiente de que el paciente sea o no sintomático y pretende prevenir complicaciones.

## Hernia Escrotal.

### Causa:

Se produce cuando el intestino o una parte de la membrana que reviste la cavidad abdominal sobresale a través de un punto débil del abdomen.

### Diagnostico y tratamiento:

Es quirúrgico y consiste en la reintroducción del contenido abdominal y reparación de la pared inguinal.

## Hernia Crural.

Causa:

La obesidad, enfermedades respiratorias y esfuerzos prolongados.

Diagnostico y tratamiento:

Es quirúrgico, se basa en las técnicas sin tensión con el uso de prótesis (mallas).

## Hernia Inguinal.

Causa:

Se produce cuando parte de la membrana que recubre la cavidad abdominal o el intestino sobresale por un orificio débil del abdomen.

Diagnostico y tratamiento:

Es posible que no recurra a tratamiento, si la hernia aumenta de tamaño o causa dolor, se puede corregir con cirugía.

## Hernia Umbilical.

Causa:

Se produce cuando parte del intestino sobresale através de la abertura umbilical en los músculos abdominales.

Diagnostico y tratamiento:

En adulto es quirúrgico.

## Formación del Peritoneo.

Causa:

Es una membrana serosa formada por tejido conjuntivo que posee dos hojas: Peritoneo Parietal y Peritoneo Visceral.

Diagnostico y tratamiento:

- 1º Quimioterapia Intra Peritoneal
- 2º Quimioterapia Intravenosa
- 3º Cirugía
- 4º Radioterapia.