

Biología Del Desarrollo

25-0C-21

Yari Karina Hernandez chacha.

CAP 14 Arteaga

Errores de la morfogenesis.

Los errores de la morfogénesis o defectos al nacimiento son cualquier alteración morfológica o funcional presente al momento del nacimiento. Los defectos del nacimiento se presentan en el 3 a 5% de los recién nacidos y esta frecuencia aumenta a medida que se incrementa la edad haciéndose más evidentes a los 5 años cuando representan el 8%. De tal manera, los errores de la morfogenesis se pueden definir como aquellas alteraciones estructurales presente durante la etapa prenatal que pueden ser apreciadas mediante métodos clínicos prenatales o al momento de la liberación del feto del cuastro materno, o de ser detectadas hasta al tiempo despues del nacimiento. El nacimiento de un niño con defectos siempre ha causado consternación pero la explicación que se ha dado ha este fenomeno ha variado de acuerdo a los conceptos magico-religiosos o filosoficos prevaletes en la epoca y el lugar. Los errores de la morfogénesis se clasifican en cuatro grupos: malformaciones, deformaciones, disrupciones y displasias. (Existen 2 tipos de defecto que son alteraciones morfológicas: - Defecto de campo monotópico labio y paladar hendidos ed ejemplos.) (Defecto de campo politópico ejemplo: efecto a cromenal que incluyen alteraciones de las extremidades y renales. Las alteraciones morfológicas pueden presentarse en forma aislada o múltiple. Alteraciones cromosomáticas numericas, Alteraciones cromosomáticas estructurales. Alteraciones geneticas. Alteraciones ambientales. Alteraciones multifactoriales.