

ERRORES DE LA MORFOGÉNESIS

Los errores de la morfogenesis es la variación morfológica o sensible presente al momento del origen por lo cual dichos defectos o daños se denominan deficiencias congénitas. trastornos que se heredan de los papas.

Los errores de la morfogenesis se dividen en malformación cualquier defecto de un órgano, resultante de un proceso de desarrollo intrauterino anormal la disrupción es un defecto morfológico, de un órgano que se resulta de los factores extrínsecos que actúan sobre un proceso de desarrollo inicialmente normal, la detención es un defecto morfológico en la forma o posición de una estructura causado por fuerza mecánica.

La Displasia es una organización anormal de células en un tejido como resultado de anomalías en el proceso de desarrollo la clasificación de los defectos alteraciones morfológicas mayores resulta afectada la función de manera considerable suelen sugerir de cirugía correctiva dependiendo de la gravedad lo alteración morfológicas menores los tipos de alteraciones morfológicas son: Hipoplasia contra Hipertrofia, Hipostofia contra Hipertrofia, agenesia, atropia, Sinplasia y Ectopia. Los alteraciones congénitas producen disminución de las cromosomas.

ERRORES DE LA APLICACIÓN NUMÉRICA EN ESTOS SISTEMAS DE CRÓMOSOMAS

La asociación cromosómica numérica en estos sistemas mayor o menor número de cromosomas los alteraciones cromosómicas estructurales. Su procedencia es la rotura de uno o más cromosomas seguido por un reordenamiento en una combinación anormal, el reordenamiento equilibrado es el inversión: Es un giro o cambio en el sentido de un fragmento cromosómico y el Translocación: Desplazamiento de un segmento de cromosoma a otro cromosoma no homólogo en algún lugar del genoma.