

CASO 2 “Sin aire, me ahogo”

Lizeth, ama de casa de 43 años es llevada a la unidad de urgencias por su hermana quien la encontró en el baño de su hogar con pérdida del estado de alerta; comenta que el mismo día por la mañana la paciente había discutido con su marido y que esta lo había amenazado con quitarse la vida. Al interrogatorio dirigido e indirecto, la paciente cuenta con antecedentes de padecer trastorno por ansiedad generalizada, tabaquismo positivo desde hace tres años a razón de dos cajetillas al día, dolor poliarticular que controla con aspirina y cuenta con el antecedente de cirugía de cuello por presentar un padecimiento de la glándula tiroides no especificado.

A la exploración física, paciente inconsciente, Glasgow 9, con presencia de bradipnea, ruidos cardiacos disminuidos tono e intensidad, con presencia de hiperreflexia ++. Se indica lavado gástrico en donde se encuentran numerosas pastillas de color blanco y restos de alimentos. Se solicita gasometría arterial con el siguiente resultado: pH 7.22, pCO₂ 67 mm Hg, pO₂ 85 mm Hg, SO₂ % 94, lactato 0.6 mmol/L.

1.-Pistas/ datos orientadores:

Bradipnea

Bradycardia

Ruidos cardiacos disminuidos en tono e intensidad

Hiperreflexia

Hallazgo de numerosas pasillas dentro del estómago.

2.-Problemas:

Cuenta con antecedentes de padecer trastorno por ansiedad generalizada, tabaquismo positivo desde hace tres años a razón de dos cajetillas al día, dolor poliarticular que controla con aspirina y cuenta con el antecedente de cirugía de cuello por presentar un padecimiento de la glándula tiroides no especificado

3.-Hipótesis/ explicaciones/ diagnósticos presuntivos:

Intoxicación por medicamentos en especial aspirina encontrados al realizar lavado gástrico en donde se encuentran numerosas pastillas de color blanco y restos de alimentos.

4.-Areas objetivos de aprendizaje:

Realización o uso de un procedimiento para ejecutar.

Comprender significado de los mensajes orales, escritos y gráficos a través de la interpretación.

5.-Fuentes de información:

Interrogatorio indirecto al acompañante del paciente.

Realización de estudios sanguíneos.