



**Nombre del alumno: KASIA OJEDA
PRZEKAZINSKA.**

**Nombre del profesor: DIEGO
SCARFATTI.**

**Nombre del trabajo: CUADRO
SINÓPTICO.**

Materia: PSICOLOGÍA MÉDICA.

Grado: 1°

Grupo: LMH14EMM0421-A

T
R
A
S
T
O
R
N
O
S
del
E
S
T
A
D
O
de
Á
N
I
M
O

- Trastorno depresivo mayor
- Trastorno bipolar
- Trastorno afectivo estacional
- Trastorno ciclotímico
- Trastorno disfórico premenstrual:
- Trastorno depresivo persistente (distimia)
- Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo
- Depresión relacionada con una enfermedad física
- Depresión inducida por el consumo de drogas o medicamentos

- Períodos prolongados y persistentes de tristeza extrema.
- También denominado «depresión maníaca» o «trastorno afectivo bipolar»; se trata de una depresión que alterna entre momentos de depresión y manía.
- Forma de depresión que, muy a menudo, está relacionada con tener menos horas de luz solar en las latitudes que se encuentran más al norte y más al sur, desde fines de otoño hasta principios de la primavera.
- Trastorno que provoca altibajos emocionales algo menos extremos que en el trastorno bipolar.
- Cambios en el estado de ánimo e irritabilidad que se producen durante la fase premenstrual del ciclo de la mujer y desaparecen con el comienzo de la menstruación.
- Forma de depresión a largo plazo (crónica).
- Trastorno de irritabilidad crónica, grave y persistente en los niños, que, a menudo, comprende berrinches frecuentes que no son coherentes con la edad de desarrollo del niño.
- Estado de ánimo deprimido persistente y pérdida significativa del placer en todas las actividades o en gran parte de estas, que tiene relación directa con los efectos físicos de otra enfermedad.
- Síntomas de la depresión que se presentan durante el consumo de sustancias, o poco después de este, de la abstinencia o después de la exposición a un medicamento.