

Periodo Pre- Patogenico

Agentes:

Espermatozoides, Tricomonas, Paliidum.

Huesped:

Mujeres edad fértil, gestantes, recién nacidos.

Medio ambiente:

Nivel socioeconómico bajo.

Falta de acceso a servicios de salud.

Prevencción Primaria

Promoción y formato

Protección específica

- % Educación; con alto prenatal, laborales, mortalmos, Pactos, preterminos.
- % Educación ETS.
- % Incentivos Monogamia.
- Uso de condones.

NO hay vacunas

NO existe inmunidad definitiva.

Control prenatal.

Abstinencia, fidelidad de parejas.

Periodo Patogenico.

Etapas

Desaparecen lesiones, aparición de secuelas, años.

Etapas

Secundaria

2 a 12 Sem. contagiosa.

Erucción papulares eritematosas, cosquillas Pruritis y Puntos, lesiones rosadas y grises, boca penévilva.

Etapas

Primaria

6 a 10 Sem. úlcera NOs (Chancro) adeno Patías.

Prevencción secundaria

DX. y Tx.

Limitación del daño

Prevencción terciaria

Rehabilitación

Hc completo Antecedentes familiares. Penicilina So dica.

DX precoz. Tx. o Posturo

Presencia de anomalías físicas al examen físico.

Penicilina pro carnica Penicilina Benzatinica.

Historia natural de la sífilis

Angel Yahir Diaz Ramos