

# HNE SIFILIS

Salud pública  
12 10 21

2

Periodo Prepatogenico

Agente: Bacteria Espiroqueta Treponema pallidum

Huesped: Afecta mas a los Varones promiscuos o en grupos de 20-44 años

Ambiente: Liberación sexual, Sexoturismo y pobreza extrema

Prevencción primaria  
Conservar la salud del individuo

promoción a la salud

protección específica

- Educación Sanitaria

- Abstinencia

- Educación Sexual

- Fidelidad de pareja

- Uso de preservativos

- No existe vacuna

Periodo Patogenico

			Secuelas
		Complicaciones	erupción mucocutánea, linfadenopatía, meningitis, condiloma
	Definición	puede causar tumores, ceguera y parálisis, o daños al sistema nervioso, cerebro y órganos o la muerte	
	Infección		
	Sigmo y síntomas		
Daño tisular	Hagas indoloras de transmisión sexual que comienza con una llaga indolora		
Lesiones de tipo destructivo o reacción fibrotica con engrosamiento en las meninges	en genitales, recto o boca, sarpullido, flujo vaginal, úlceras, dolor de garganta, fatiga, ganglios		

Estado Crónico	Prevencción Secundaria	
Puede causar una serie de infecciones crónicas durante los primeros 2-3 años que luego puede evolucionar a fase 3	Diagnostico precoz	Tratamiento oportuno
	- Examen sanguíneo	- Antibióticos
	- prueba serica	
	- penicilina	
	- Eritromicina	

Prevencción Terciaria

Rehabilitación

- Facilitades de empleo
- Terapia ocupacional
- Atención de órganos